Effects of Manganese Oxide Nanoparticles and Bulk Manganese Oxide via Seed Priming on *Portulaca oleracea* L.

Mahshad Movahedi[1], Sedigheh Arbabian[1]*, Ahmad Majd[1], Golnaz Tajadod[1], Sayeh Jafari Marandi[1]

1- Department of Biology, NT. C., Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Abstract

Aim and Background: *Portulaca oleracea* (purslane) is a halophyte plant known for its high nutritional and medicinal value. Due to its resistance to environmental stresses and abundance of metabolic compounds, it plays a significant role in agriculture and medicine. With the promising advancements in nanotechnology in agriculture, nanoparticles have been introduced as alternatives to traditional compounds. This study aimed to systematically compare the effects of manganese oxide nanoparticles (Mn_2O_3 NPs) and bulk manganese oxide (Bulk Mn_2O_3) on seed germination, early growth, and physiological processes in purslane through seed priming. This research is the first comprehensive evaluation of the simultaneous effects of manganese form and concentration on this plant.

Materials and Methods: In this study, the characteristics of the nanoparticles were examined using electron microscopy (SEM/TEM). Purslane seeds were treated with different concentrations (0, 10, 100, 500 mg/L) of manganese oxide nanoparticles and bulk manganese oxide. Growth parameters (root and shoot length, fresh and dry weight), germination parameters (germination percentage and rate), and chlorophyll content (a, b, and total chlorophyll) were measured, and the data were analyzed using Duncan's test in SPSS software.

Results: manganese oxide nanoparticles at high concentrations (100-500 mg/L) caused a significant reduction of 30-40% in root and shoot length. However, the lower concentrations of manganese oxide nanoparticles (10 mg/L) improved the germination percentage and rate by 15% compared to the control. Bulk manganese oxide at all concentrations led to a 25% improvement in root and shoot length, as well as fresh and dry weight of Purslane seedlings. 20-35%. A significant reduction in chlorophyll content was observed in all treated groups, with the highest reduction in chlorophyll content associated with the highest concentration of manganese oxide nanoparticles (500 mg/L).

Conclusion: This study shows that bulk and nanoparticle forms of manganese oxide have contrasting effects on the growth and physiological processes of Purslane. Manganese oxide nanoparticles at high concentrations exhibit notable toxicity, while at lower concentrations (10 mg/L), they act as a biostimulant and are useful for seed germination. On the other hand, bulk manganese oxide, despite improves growth parameters (root and shoot length), its use should be recommended with caution due to the reduction in seedling weight and chlorophyll content. Overall, the role of nanoparticles as a novel factor in seed priming is highlighted, suggesting that their use as a stable alternative to conventional compounds can enhance seed germination and plant resistance while minimizing environmental pollution.

Keywords: Purslane, manganese oxide nanoparticles, bulk manganese oxide, seed priming, oxidative stress

Corresponding Author:
Sedigheh Arbabian; Department of Biology, NT.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran;
Email: Sedigheharbabian@iau.ac.ir

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

اثرهای نانوذرات اکسید منگنز و اکسید منگنزِ بالک از طریق پرایمینگ بذر در گیاه خرفه (*Portulaca oleracea* L.)

مهشاد موحدی[۱]، صدیقه اربابیان[۱*]، احمد مجد[۱]، گلناز تجدد[۱]، سایه جعفری مرندی[۱]

۱- گروه زیست‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: گیاه خرفه (*Portulaca oleracea* L.) جزء گیاهان هالوفیت و دارای ارزش‌غذایی و دارویی بالایی است. این گیاه به‌دلیل مقاومت در برابر تنش‌های محیطی و فراوانی ترکیب‌های متابولیتی از جایگاه ویژه‌ای در کشاورزی و پزشکی برخوردار است. با توسعهٔ امیدوارکنندهٔ فناوریِ نانو در کشاورزی به‌عنوانِ جایگزینِ ترکیب‌های سنّتی معرفی شدند. این مطالعه با هدف مقایسهٔ سیستماتیک اثرهای نانوذراتِ اکسیدِ منگنز (Mn_2O_3 NPs) و فرمِ بالک اکسیدِ منگنز ($BulkMn_2O_3$) بر جوانه‌زنی، رشد اولیه و فرایندهای فیزیولوژیکیِ گیاهِ خرفه از طریق پرایمینگ بذر انجام شد. در این پژوهش، نخستین ارزیابیِ جامع در مورد تأثیر هم‌زمان فرم و غلظت منگنز بر روی گیاهِ خرفه صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش، ویژگی‌های نانوذرات با میکروسکوپ الکترونی (SEM/TEM) بررسی شد. بذرهای خرفه با غلظت‌های (۰، ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) از نانوذرات اکسید منگنز و اکسید منگنز بالک تیمار شدند. پارامترهای رشد (طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن تر و خشک)، پارامترهای جوانه‌زنی (درصد و سرعت جوانه‌زنی) و محتوای کلروفیل (a، b و کلروفیل کل) سنجش و داده‌ها توسط آزمون دانکن در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.

یافته ها: نانوذرات اکسید منگنز در غلظت‌های بالا (۱۰۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) موجب کاهش معنادار ۳۰-۴۰٪ در طولِ ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن تر و خشک شدند. اما غلظتِ پایینِ نانوذرات اکسید منگنز (۱۰ میلی‌گرم در لیتر) موجب بهبود ۱۵٪ سرعت و درصد جوانه‌زنی در مقایسه با شاهد شد. اکسید منگنز بالک در تمام غلظت‌ها تا ۲۵٪ باعث بهبود در طولِ ریشه‌چه و ساقه‌چه شد. اما باعث کاهش ۲۰٪ وزن تر و خشکِ گیاهچه‌های خرفه شد. همچنین کاهش معنادار ۳۵-۵۰٪ در محتوای کلروفیلِ تمامیِ گروه‌های تیمارشده مشاهده شد که بیشترین کاهشِ کلروفیل مربوط به بالاترینِ غلظت نانوذرات اکسید منگنز (۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) بود.

نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می‌دهد که فرم بالک و نانوذرات اکسیدِ منگنز موجب تأثیرهای متضاد بر فرایندهای رشد و فیزیولوژیکِ خرفه می‌شوند. نانوذرات اکسید منگنز در غلظت‌های بالا اثرهای سمّیِ قابل‌توجهی دارند و در غلظت‌های پایین (۱۰ میلی‌گرم در لیتر) به‌عنوان یک محرّک زیستی در بهبود فرایند جوانه‌زنی کاربردی و مورداستفاده هستند. ازسویی‌دیگر، اکسید منگنز بالک با وجود بهبود پارامترهای رشد (طول ریشه‌چه و ساقه‌چه)، به‌دلیل کاهش در وزنِ گیاهچه‌ها و محتوای کلروفیل بهتر است با احتیاط استفاده شود. این یافته‌ها به‌طور کلی نقش نانوذرات را به‌عنوان یکی از عواملِ نوین در پرایمینگ بذر برجسته می‌کند که با استفادهٔ هدفمند، به‌عنوانِ جایگزینی پایدارتر برای ترکیب‌های سنّتی می‌تواند جوانه‌زنی و مقاومت گیاه را با حداقل آلودگیِ زیست‌محیطی در شرایط تنش بهبود بخشند.

واژگان کلیدی: خرفه، نانوذرات اکسید منگنز، اکسید منگنز بالک، پرایمینگ بذر، تنش اکسیداتیو.

نویسندهٔ مسئول: صدیقه اربابیان؛ دانشیار گروه زیست‌شناسی،
واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛
پست الکترونیکی: Sedigheharbabian@iau.ac.ir

تاریخ دریافت:۱۴۰۳/۱۲/۲۷ تاریخ پذیرش:۱۴۰۴/۰۳/۲۱

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

۱- مقدمه

گیاهِ دارویِی خرفه (*Portulaca oleracea* L.) که به خانوادۀ *Portulacaceae* تعلق دارد، گیاهی یک‌ساله و علفی که دارای ساقه و برگ‌های آبدار است (۱). این گیاه گرمادوست و چهارکربنه و مسیر فتوسنتزی آن از نوع C_4 است (۲). این گیاه را با نام (*Purslane*) در جهان می‌شناسند. جزء ده گیاهِ شناخته‌شده در جهان می‌باشد که برگ، ساقه و دانۀ آن مصرفِ دارویی و غذایی دارد. نتایجِ پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که این گیاه دارای ارزشِ تغذیه‌ایِ بالا نسبت به بیشتر گیاهانی است که در قالب سبزیجات مصرف می‌شوند و ویژگیِ دارویِی بالای آن منجرشده که سازمان بهداشت جهانی به آن لقب (Global Panacea) دهد (۳). به‌دلیل داشتنِ خواصِ آنتی‌اکسیدانی و ارزش‌غذایی بالا از خرفه به‌عنوان یک غذای مقوی در آینده یاد می‌شود، این گیاه توانایِی رشد در شرایط مختلف آب‌وهوایی و خاک را دارد (۴). علاوه‌بر این، منبعِ غنی از اسیدهای چرب امگا-۳ (اسید لینولنیک) و اسیدهای چرب امگا-۶ (اسید لینولئیک) می‌باشد و مصرف آن به‌علت غنی بودن از اسیدهای چرب غیراشباعِ امگا-۳ و وجود آنتی‌اکسیدان‌ها باعث خنثی شدن رادیکال‌های آزاد و تقویت سیستم‌ایمنی می‌گردد و موجب شده این گیاه به‌عنوان سبزیِ عالی در رژیم‌غذاییِ انسان باشد (۵). خرفه پراکندگیِ جهانی دارد و بومیِ مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است (۶). براساس مطالعه‌های انجام‌شده، خرفه ارزش‌غذاییِ بالاتری نسبت به بیشتر سبزیجات دارد و جزء دستۀ غذاهای قدرتمند قرار دارد که این غذاها دارای محتوای مغذیِ بالایی هستند (۷). محققان با مطالعه‌های متعدد *in-vitro* و *in-vivo* که بر روی خرفه انجام داده‌اند، به نتایج بسیار مهمی در مورد اثرهای دارویِی این گیاه دست یافته‌اند، از جمله می‌توان به اثر ضدسرطانی، ضد زخم، ضدالتهابی، ضدقارچی، ضدباکتری، محافظت‌کنندۀ سیستم عصبی، گشاد کنندۀ راهِ تنفسی و آرام‌بخشی اشاره کرد (۶). منگنز (Mn) دومین عنصر کمیاب در کرۀ زمین است و یکی از عناصر مهم در رشد و نمو گیاهان است (۸). منگنز یک عنصر ضروری است که نقش کلیدی در فرایندهای مهم متابولیکی و فیزیولوژیکی در گیاهان ایفا می‌کند، از جمله به فتوسنتز، تنفس، سنتز اسیدهای چرب و پروتئین‌ها می‌توان اشاره نمود (۸). استفاده از عناصرِ ضروی مانند منگنز جهت بهبود رشد و افزایش عملکرد گیاه نقش کلیدی دارد (۹). کمبود منگنز در گیاهان می‌تواند باعث اختلال تغذیه‌ای، کاهش رشد و عملکرد در گیاه شود (۱۰). درحالی‌که میزان بالای این عنصر نیز در گیاهان باعث ایجاد سمیّت و افزایش تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS)، آسیب اکسیداتیو به پروتئین‌ها و لیپوپراکسیداسیون می‌شود (۱۱). فناوریِ نانو، یک فناوری روبه‌توسعه است که امروزه در جنبه‌های مختلف زندگیِ انسان واردشده و مطالعه‌های متعدد انجام‌شده، جنبه‌های خوش‌بینانه‌ای از نانوذرات در علومِ گیاهی و صنایعِ کشاورزی را نشان داده است (۱۲). نانوذرات به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد مانند مساحت سطح بالا، نفوذپذیری و جذب بهتر موردتوجه بسیاری از محققان قرار گرفته‌اند. اگر استفاده از نانوذرات در شرایط و زمانِ مناسب و با روش مؤثر انجام شود، می‌تواند عملکرد گیاه را به‌خصوص در مراحل اولیۀ رشد بهبود دهد (۱۳، ۱۴). تغییرهای ناشی از نانوذرات شدیداً تحت‌تأثیر عوامل مختلف از جمله نوع نانوذرات، غلظت به‌کار رفته، نوع گونۀ گیاهی و روش به‌کار رفته است (۱۳). محققان در این حوزه درحال تلاش برای به‌دست آوردن یک دیدگاه جامع در مورد نحوۀ عملکرد نانوذرات هستند اما شواهد و نتایج به‌دست‌آمده برای رسیدن به یک دیدگاه مشترک و جامع بسیار پیچیده و دشوار است. به‌دلیل اینکه گیاهان دارای گونه‌های مختلفی هستند و بسیاری از این مطالعه‌ها بر روی محصولات کشاورزی انجام شده است (۲۰). بعضی از بررسی‌ها اثرهای مشابه نانوذرات با فرم‌های بالک و یونیِ آن‌ها را گزارش داده‌اند (۱۳) و بعضی دیگر از مطالعه‌ها، اثرهای متفاوت نانوذرات به‌دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند را گزارش داده‌اند (۷، ۱۵). البته کاملاً پذیرفته‌نشده که عناصر در فرم نانوذرات بر روی گیاهان تأثیر بسیار مطلوب‌تری دارند. به‌منظور دستیابی به بازدهی بیشتر توسط نانوذرات، یافتن اینکه چه نوعی از نانوذرات و با چه غلظت‌هایی موجب بهبود بهره‌وری گیاه می‌شود بسیار حیاتی و مهم است. مطالعه‌های بسیاری در مورد تأثیر نانوذرات بر روی گیاهانِ زراعی انجام شده است، امّا در مورد تأثیر نانوذرات بر روی گیاهانِ دارویی مطالعه‌های کمی انجام شده است. گیاهان دارویی و فناوری نانو بسیار جنبۀ کاربردی دارند. گیاهان دارویی را به‌دلیل منابع سرشار از مواد اولیه در صنعتِ داروسازی درنظر

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

می‌گیرند. این گیاهان نباید در محیط‌های آلوده رشد داده شوند و همچنین باید مواد شیمیایی برای تحریک و تقویت رشدِ آن‌ها به‌میزانِ حداقل باشد. اخیراً استفاده از نانوذرات موردتوجه محققان است زیرا می‌توان با میزانِ کمتری از مادۀ موردنظر به نتایج مشابه با همتایان آن در فرم بالک دست یافت (۱۳، ۱۶). این مطالعه با هدف مقایسۀ اثر نانوذرات اکسید منگنز و اکسید منگنز بالک بر روی جوانه‌زنیِ بذرها و تکوینِ دانه‌رُست‌ها و محتوای کلروفیلیِ گیاه خرفه طراحی شده است. نتایج این پژوهش می‌تواند کمک شایانی به درک بهتری از اثرهای مثبت و منفی نانوذراتِ اکسید منگنز بر روی رشد اولیه و تغذیۀ گیاه خرفه داشته باشد.

۲- مواد و روش‌ها

بذرهای گیاه خرفه (*Portulaca Oleracea*) از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد. بذرها طبق پروتکل ISTA (انجمن بین‌المللی آزمون بذر) از نظر درصد خلوص (≥۹۹ درصد) و درصد قوه‌نامیه (≥۹۹ درصد) ارزیابی شدند. ابتدا فرایند استریل‌سازی بذرها انجام شد؛ بذرها در هیپوکلریت سدیم ۳ درصد همراه با دو قطرۀ مایعِ شوینده به‌مدت ۱۰ دقیقه قرار داده شدند و سپس چندبار با آب مقطر شست‌وشو داده شدند. نانوذرات اکسید منگنز از شرکت پیشگامان نانومواد ایرانیان خریداری شد و همچنین اکسید منگنز بالک ساخت شرکتِ مرک آلمان تهیه شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوذرات اکسید منگنز به‌وسیلۀ میکروسکوپ الکترونیِ SEM و میکروسکوپ الکترونیِ TEM بررسی شد؛ در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که اندازۀ نانوذرات اکسید منگنز ۳۰ نانومتر و دارای شکل کروی و خلوص ۹۹/۲ درصد است که به‌دلیل درصد خلوص بالا و پایداری از این نانوذره در مطالعۀ حاضر استفاده شد. این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) با سه تکرار در هر تیمار در آزمایشگاهِ تحقیقاتیِ زیست‌شناسیِ دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال انجام شد. بذرهای استریل‌شدۀ خرفه تحت تیمار با سه غلظت نانوذات اکسید منگنز Mn_2O_3 NPs و اکسید منگنز بالک Mn_2O_3 Bulk (mgL^{-1} ۰، ۱۰، ۱۰۰، ۵۰۰) قرار گرفتند. بذرها به‌مدت دو ساعت بر روی شیکر چرخشی در دمای ۲۰ درجۀ سانتی‌گراد در معرض سوسپانسیون‌های مختلفِ نانوذرات و بالک اکسید منگنز و آب‌مقطر قرار گرفتند، سپس با آب‌مقطر شست‌وشو داده‌شده و تعداد بیست بذر بر روی کاغذِ صافیِ واتمن مرطوب به ظروف پتری‌دیشِ استریل منتقل شد و به‌مدت هفت روز در قفسۀ نوری تحت شرایط نوریِ کنترل‌شده، ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی (با استفاده از لامپ‌های ۳۶ وات فلورسنت و در فاصلۀ ۳۰ سانتی‌متری از نمونه‌ها) در دمای اتاق ۲±۲۵ درجۀ سانتی‌گراد قرار داده شدند. تعداد بذرهای جوانه‌زده روزانه شمارش و ثبت گردیدند. درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن تر و خشک اندازه‌گیری شدند و سنجش محتوای کلروفیل شصت روز بعد از تیماردهی انجام شد. این سنجش‌ها زمانی انجام شده‌اند که گیاه در فازِ رویشی قرار داشته است. گروه‌بندی در پژوهش حاضر به‌صورت زیر انجام شد (جدول ۱).

جدول ۱- گروه‌بندی تیمارها

Treatment Code	Treatment description
C	Control
T1	Bulk Mn2O3 10 mgL^{-1}
T2	Bulk Mn2O3 100 mgL^{-1}
T3	Bulk Mn2O3 500 mgL^{-1}
T4	Mn2O3 NPs 10 mgL^{-1}
T5	Mn2O3 NPs 100 mgL^{-1}
T6	Mn2O3 NPs 500 mgL^{-1}

۲-۱- سنجش درصد جوانه‌زنی

بذرها هنگامی جوانه‌زده درنظر گرفته شدند که ریشه‌چه‌های قابل‌مشاهده از پوستۀ بذرها خارج شده بودند. از رابطۀ زیر برای محاسبۀ درصد جوانه‌زنی استفاده شد:

$$GP = (Ni / N) \times 100$$

GP: درصد جوانه‌زنی

Ni: تعداد بذر جوانه‌زده در روزِ آخرِ شمارش

N: تعداد کل بذرها

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

۲-۲- سنجش سرعت جوانه‌زنی

سرعت جوانه‌زنی با تقسیم تعداد تجمعیِ بذرهای جوان‌زده در هر شمارش به کل بذرهای جوانه‌زدهٔ نهایی، تعیین و زمان صرف‌شده تا رسیدن به ۵۰ درصد جوانه‌زنی محاسبه شد. بنابراین برای محاسبهٔ سرعت جوانه‌زنی از رابطهٔ زیر استفاده شد (۱۷):

$$GR = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{ni/diR}$$

GR: سرعت جوانه زنی

ni: تعداد بذر جوانه‌زده در هر شمارش

di: تعداد روز شمارش تا روز nام

۲-۳- سنجش طول ریشه‌چه و ساقه‌چه

بعد از مدت ۱۰ روز کشت پتری‌دیش بذرها شاخص‌های رشد شامل طول ریشه‌چه و ساقه‌چه توسط خط‌کشِ دقیق اندازه‌گیری و ثبت شد.

۲-۴- سنجش وزن تر و خشک جوانه‌های خرفه

وزن تر و خشک جوانه‌ها توسط ترازوی دقیقِ دیجیتال ساخت کمپانی Sartorius با ۰/۰۰۰۰۱ مشاهده و یادداشت گردید. پس از طی مدت ۵ روز بعد از جوانه‌زنی و اندازه‌گیریِ وزن تر جوانه‌ها به‌صورت جداگانه، برای تعیین وزن خشک جوانه‌ها، نمونه‌ها در پاکت‌های کاغذی قرار گرفته و در آون با دمای ۸۰ درجهٔ سانتی‌گراد تا پایان خشک شدنِ کامل نمونه‌ها (مدت ۲۴ ساعت) (به‌علت محتوای رطوبتیِ پایین آن‌ها) قرار گرفته و بعد توزین شدند.

۲-۵- سنجش رنگیزه‌ها

از روش lichtenthaler استفاده شد. ۶۰ روز بعد از شروع تیماردهی، حدود ۰/۱ گرم برگ از هر نمونه را با ۱۰ میلی‌لیتر استون ۸۰ درصد درون لولهٔ آزمایش ریخته و به‌وسیلهٔ سانتریفوژ همگن شد و سپس جذب به‌وسیلهٔ اسپکتروفتومتری برای اندازه‌گیریِ کلروفیل a، b و کلروفیل کل ثبت شد (۱۸).

۲-۶- تجزیه‌وتحلیل آماری

آزمون آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS v26 انجام شد. مقایسهٔ میانگین‌ها با آزمون دانکن و در سطحِ احتمال $P\leq0.05$ انجام شد. خطای استاندارد (SE) برای تمام پارامترها محاسبه شد و در نمودارهای ترسیم‌شده، نمایش داده شد.

۳- نتایج

۳-۱- تأثیر تیمارها بر جوانه‌زنیِ بذر

با توجه به تصویر 1A، درصد جوانه‌زنی در تمام گروه‌های تحت تیمار با نانوذرات اکسید منگنز و اکسید منگنز بالک (۱۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) در مقایسه با گروه شاهد افزایش جزیی داشت، که بیشترین میزانِ آن در تیمارهای ۱۰ میلی‌گرم در لیتر بالک اکسید منگنز و ۱۰ میلی‌گرم در لیتر نانوذرات اکسید منگنز مشاهده شد. بااین‌حال، این افزایش از نظر آماری ($P\leq0.05$) معنادار نبود. با توجه به نمودار B در تصویر ۱، بیشترین افزایش سرعت جوانه‌زنی مربوط به گروهِ تیمارشده با ۱۰ میلی‌گرم در لیتر نانوذرات اکسید منگنز مشاهده شد، که این تغییرها از نظر آماری معنادار نبودند. در مقابل، کمترین سرعت جوانه‌زنی در گروه‌های تیمارشده با ۱۰ میلی‌گرم در لیتر اکسید منگنز بالک و ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانوذرات اکسید منگنز ثبت شد و این کاهش نسبت به گروه کنترل از نظر آماری معنادار بود (تصویر 1B).

۳-۲- تأثیر تیمارها بر طول ریشه‌چه و ساقه‌چه

طول ریشه‌چه در گروه‌های تیمارشده با اکسید منگنز بالک نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. درحالی‌که در گروه‌های تحت تیمار با نانوذرات اکسید منگنز، کاهش طول ریشه‌چه مشاهده شد. بیشترین طول ریشه‌چه مربوط به گروه تحت تیمار با غلظت ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر اکسید منگنز بالک و کمترین طول ریشه‌چه مربوط به گروه تیمارشده با ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانوذرات اکسید منگنز بود که این تفاوت‌ها (افزایش و کاهش طول ریشه‌چه) در مقایسه با شاهد از نظر آماری ($P\leq0.05$) معنادار است (تصویر 1C). این نتایج نشان می‌دهد، نانوذرات اکسید منگنز نسبت به فرم بالک اثرهای بازدارندهٔ بیشتری بر رشد ریشه‌چه دارند. در بررسی طول ساقه‌چه، بیشترین طول در گروه تیمارشده با ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر اکسید منگنز بالک مشاهده شد، اما از نظر آماری ($P\leq0.05$) معنادار نبود.


در مقابل، کمترین طول ساقه‌چه در گروه تیمارشده با ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانوذرات اکسید منگنز مشاهده شد که این کاهش نسبت به گروه شاهد از نظر آماری ($P\leq0.05$) معنادار بود (تصویر 1D).

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

درواقع با افزایش غلظت اکسید منگنز بالک، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه روندی افزایشی داشت، درحالی‌که افزایش غلظت نانوذرات اکسید منگنز باعث کاهش طول ریشه‌چه و ساقه‌چه شده است.

۳-۳- تأثیر تیمارها بر وزن تر و خشک جوانه‌های خرفه

وزن تر و خشک جوانه‌ها در تمام گروه‌های تیمارشده با نانوذرات اکسید منگنز و اکسید منگنز بالک در مقایسه با شاهد کاهش یافت و از نظر آماری ($P\leq0.05$) در مقایسه با شاهد معنادار بود. وزن خشکِ جوانه‌ها در تمام گروه‌های تحت تیمار کاهش یافت و این کاهشِ وزنِ خشک در گروه‌ها در مقایسه با گروهِ کنترل از نظر آماری معنادار است (تصویر 1F و 1E). هر دو فرم اکسید منگنز (نانوذرات و بالک) اثر منفی بر رشد و زیست‌توده در گیاهچه‌ها دارند، البته تأثیر نانوذرات شدیدتر بوده است.




شکل ۱- نمودار شاخص‌های رشد (A: درصد جوانه‌زنی)، (B: سرعت جوانه‌زنی)، (C: طول ریشه‌چه)، (D: طول ساقه چه)، (E: وزن تر گیاهچه)، (F: وزن خشک گیاهچه). حروف کوچک متفاوت نشان‌دهندهٔ این است که تفاوت از نظر آماری ($P\leq0.05$) معنادار است و حروف مشابه نشان‌دهندهٔ این است که تفاوت آماری معناداری وجود ندارد.

۳-۴- تأثیر تیمارها بر رنگیزه‌های کلروفیلی

با بررسی نتایجِ حاصل از سنجش رنگیزه‌های کلروفیلی، کاهش معنادار کلروفیل a ، b و کلروفیل کل در همهٔ گروه‌های تحت تیماردهی نسبت به گروهِ کنترل مشاهده شد. بیشترین میزانِ کلروفیل در گیاهانِ گروهِ شاهد مشاهده شد، درحالی‌که کمترین میزانِ کلروفیل مربوط به گروهی است که در معرض بالاترین غلظت نانوذرات اکسید منگنز و پس از آن، مربوط به گروهی است که تحت تیمار با بالاترین غلظت اکسید منگنز

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

بالک بود، که این تغییرها نسبت به کنترل از نظر آماری ($P\leq0.05$) معنادار است (نمودار ۱ و جدول ۲). نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، نانوذرات اکسید منگنز تأثیر منفیِ بیشتری بر فتوسنتز دارند.



نمودار ۱- نمودار رنگیزه‌های کلروفیلی، حروف کوچک متفاوت نشان‌دهندۀ وجود تفاوت آماریِ معنادار است و حروف مشابه نشان‌دهندۀ اینست که تفاوت آماری معناداری وجود ندارد.

جدول ۲- اثر غلظت‌های مختلف نانوذرات و بالک اکسید منگنز (۰، ۱۰، ۱۰۰ و ۵۰۰) بر محتوای کلروفیل a، b و کلروفیل کل

Treatment	ChI a (mg g^{-1}FW)	ChI b (mg g^{-1}FW)	Total ChI (mg g^{-1}FW)
Control	22.04±0.09a	5.33±0.08a	27.38±0.09a
Bulk Mn_2O_3 10	14.16±0.01c	3.53±0.01b	17.69±0.09c
Bulk Mn_2O_3 100	11.90±0.08e	2.66±0.01c	14.56±0.08e
Bulk Mn_2O_3 500	9.42±0.05g	2.57±0.02c	11.99±0.08g
Mn_2O_3 NPs 10	15.26±0.02b	3.64±0.03b	18.89±0.16b
Mn_2O_3 NPs 100	13.35±0.06d	3.29±0.04b	16.64±0.10d
Mn_2O_3 NPs 500	10.28±0.08f	2.50±0.04c	12.78±0.12f

مقادیر به‌صورت mean ± standard error در سه تکرار ارائه شده است. حروف کوچک متفاوت نشان‌دهندۀ تفاوت معنادار آماری می‌باشد.

۴- بحث

جوانه‌زنی ، یک فرایند پیچیده است و از آسیب‌پذیرترین مراحل در چرخۀ زندگیِ گیاه است ، این مرحله تحت‌تأثیر عواملِ درونی و بیرونی قرار دارد. فرایند جوانه‌زنی از رشد قوی و سالم گیاه حمایت می‌کند. طی پژوهش‌های انجام‌شده مشخص شد، جوانه‌زنیِ ناهمواریِ بذر با کاهشِ بهره‌وریِ محصولاتِ کشاورزی ارتباط دارد. همچنین تیماردهیِ بذرها موجب بهبودِ کیفیت بذرها و رشد بیشترِ گیاه می‌شود (۱۳، ۱۹).

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، تیماردهی بذرهای خرفه با نانوذرات و فرم بالک اکسید منگنز در غلظت‌های مختلف تأثیرهای متفاوتی بر شاخص‌های جوانه‌زنی داشت. اگرچه درصد جوانه‌زنی در تمامی تیمارها نسبت به گروه شاهد افزایش جزیی را نشان داد، اما این افزایش از نظر آماری معنادار نبود. بیشترین درصد جوانه‌زنی در تیمارهای ۱۰ میلی‌گرم در لیتر بالک اکسید منگنز و ۱۰ میلی‌گرم در لیتر نانوذرات اکسید منگنز مشاهده گردید. به‌طور کلی، این نتایج نشان می‌دهند که تأثیرهای نانوذرات و بالک به‌شدت وابسته به غلظت آن‌ها است و غلظت‌های پایین می‌تواند مؤثرتر و ایمن‌تر باشد. این نتایج با مطالعۀ زیاری و همکاران همسویی دارد. آن‌ها نشان دادند که تیمارهای نانوذرات اکسید منگنز در غلظت‌های پایین (۰/۰۱ و ۰/۰۵) موجب افزایش جوانه‌زنیِ بذرهای گیاهِ کاسنی می‌شود (۲۰). طبق نتایج، کمترین سرعت جوانه‌زنی مربوط به گروه تحت تیمار با ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانوذرات اکسید منگنز بوده است که این رویداد ممکن است به‌دلیل اختلال در فعالیت

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

آنزیم‌های مداخله‌گر در فرایند جوانه‌زنی و یا به‌علت کاهش جذب آب توسط بذرها باشد. در طی مطالعه‌ای که Munawar و همکارانش به بررسی پرایمینگ بذرِ هویج با بالک منگنز پرداختند، آن‌ها مشاهده کردند که فرم بالک منگنز می‌تواند باعث کاهش جوانه‌زنی بذرها و یا به تعویق افتادن جوانه‌زنی شود که این نتایج با نتایج ما همسویی دارد (۲۱). در پژوهشی که salehi و همکاران بر روی گیاه درمنه (*Artemisia annua*) انجام دادند، بیان کردند غلظت ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوذرات اکسید منگنز باعث تحریک جوانه‌زنی و رشد شده است اما غلظت‌های بالاتر موجب تأخیر در جوانه‌زنی و مهار رشد شده است (۱۳). طی چند تحقیقِ مختلفی که do Espirito Santo Pereira و همکاران، Nile و همکاران انجام داده‌اند، گزارش کردند که تیماردهیِ بذر با نانوذرات در غلظت‌های پایین به‌طور معنی‌داری جوانه‌زنی را در مقایسه با فرمِ یونی و شاهد بهبود می‌بخشد که این فرایند از طریق تسریع در جذب آب و مواد مغذی اتفاق می‌افتد که با ایجاد منافذی در پوستهٔ بذر انجام می‌شود (۲۲). یافته‌های این مطالعه نشان دادند که تأثیر نانوذرات و بالک اکسید منگنز بر گیاه خرفه تحت‌تأثیر غلظت و ساختار این ذرات قرار دارند. نانوذرات در غلظت‌های پایین‌تر توانایی عملکرد به‌عنوان محرک‌های زیستی را دارند، اما در غلظت‌های بالا، موجب القای تنش اکسیداتیو و اختلال در رشد گیاه می‌شوند. از طرفی دیگر، فرم بالک اکسید منگنز سمیّت کمتری را نشان داد، حتی در غلظت‌های بالاتر توانایی تحریک رشدِ گیاه را دارد. این تفاوت‌ها ممکن است به‌دلیل اندازهٔ بزرگ‌تر ذرات و رهاسازیِ آهسته‌تر یون‌های منگنز در فرم بالک باشد. براساس نتایج، بین غلظت نانوذرات اکسید منگنز و پارامترهای رشد اولیهٔ گیاه رابطهٔ معکوس وجود دارد. کاهش طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن تر و خشک گیاهچه در غلظت‌های بالای نانوذرات اکسید منگنز (۱۰۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) مشاهده شد که این اختلال در رشد ممکن است به‌دلیل تجمع گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و اختلال در تقسیم سلولی باشد (۱۳). طبق مطالعه‌های انجام‌شده، نانوذرات می‌توانند با ایجاد تنش اکسیداتیو، باعث آسیب به DNA و پروتئین‌ها شوند و در نهایت موجب اختلال در رشد و تکامل گیاه شوند (۲۳). همچنین جذب بیش‌ازحد یون‌های Mn^{2+} از نانوذرات اکسید منگنز می‌تواند جذب مواد مغذیِ ضروری مانند: منیزیم، کلسیم و آهن را در گیاهان کاهش دهد (۲۴). کمبود این عناصر موجب اختلال در سنتز کلروفیل و فعالیت آنزیم‌های ضروری در فتوسنتز می‌شود و رشد گیاه کاهش می‌یابد (۲۵).

این نتایج با مطالعه‌های Tian و همکاران، Khodakovskaya و همکاران همسو است، آن‌ها گزارش داده‌اند نانوذرات در غلظت‌های پایین‌تر می‌توانند اثرهای مفیدی بر روی گیاهان داشته باشند (۲۶، ۲۷). اثرهای مفید غلظت‌های پایین نانوذرات منگنز ممکن است به‌علت نقش منگنز در فعالیت بعضی از آنزیم‌ها و فرایندهای متابولیکی در گیاه باشد (۱۳). در مطالعهٔ حاضر، تیماردهی با اکسید منگنز بالک موجب افزایش طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و کاهش وزن تر و خشک گیاهچه‌های خرفه شد که این نتایج نشان می‌دهند، اکسید منگنز در فرم بالک در مقایسه با فرم نانو دارای سمیّت کمتری بر روی این گیاه است و حتی در غلظت‌های بالاتر نیز می‌تواند رشد ریشه‌چه و ساقه‌چه را تحریک کند. این پدیده احتمالاً به‌دلیل اندازهٔ بزرگتر ذرات منگنز در فرم بالک است که باعث شده نفوذ، جذب و انتقال آن‌ها در گیاه به‌صورت آهسته‌تر و کنترل‌شده‌تر اتفاق بیوفتد و در نتیجه، تنش اکسیداتیو در گیاه کمتر ایجادشده و باعث بهبود رشد گیاه می‌شود (۲۸). در غلظت‌های بالای اکسید منگنز بالک، اختلال در جذب آب و مواد مغذی رخ می‌دهد که می‌تواند به‌دلیل تجمع منگنز در بافت‌های گیاهی و ایجاد سمیّت در گیاه باشد. در مطالعه‌ای که Alejandro و همکاران در مورد تأثیر فرم‌های مختلف منگنز در گیاهان انجام دادند، بیان کردند که منگنز در فرم بالک در مقایسه با فرم نانوذرات سمیّت کمتری دارد و فرم بالک منگنز در غلظت‌های بالا موجب اختلال در سیستمِ آنتی‌اکسیدانی در گیاه می‌شود (۲۹). در مطالعهٔ دیگری که Millaleo و همکاران انجام دادند، بیان کردند که غلظت‌های بالای منگنز باعث کاهش وزنِ خشک در گیاهان می‌شود که به‌دلیلِ اختلال در جذبِ عناصرِ مغذی است (۳۰). کاهش معنادار رنگیزه‌های کلروفیلی a، b و کلروفیلِ کل در تمامیِ گروه‌های تیمارشده با نانوذرات و بالک اکسید منگنز در مقایسه با گروه کنترل، نشان‌دهندهٔ اختلال در بیوسنتز کلروفیل است. این کاهش دلایلِ مختلفی می‌تواند داشته باشد، ممکن است منگنز از طریقِ آسیب به غشای سلولی وارد سلول‌های گیاهی شده و سپس جایگزینِ منیزیم در مرکز فعال کلروفیل‌شده و عملکرد آن را مختل کند. علاوه‌بر این، تنش اکسیداتیو باعث

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

فعال‌سازیِ آنزیم کلروفیلاز شده و این آنزیم موجب تجزیهٔ کلروفیل می‌شود (۳۱).

همچنین منگنز در گیاهان به‌عنوان یک مادهٔ مغذیِ مهم و ضروری است و نقشِ مهمی در فتوسیستم II (که بخشی از فرایند فتوسنتز است) دارد (۳۲) و همچنین منگنز یک کوفاکتور آنزیم ATPase در فرایند فتوسنتز است که در بازسازی و تولیدِ انرژی فعالیت دارد (۳۳). در شرایط کمبود منگنز در گیاه، کمبود ATP اتفاق می‌افتد و در نتیجه فرایند فتوسنتز کاهش می‌یابد و علتِ اصلیِ کاهشِ پارامترهای مورفولوژیکی و کاهش بهره‌وری در گیاه است (۳۴). Netto و همکاران علت کاهش کلروفیل در برگ‌های قهوه تحت تنش را آسیب دیدن غشای کلروپلاست و تأثیر مخرب بر واکنش‌های نوری، انتقال الکترون و افزایش تولید اکسیژن فعال می‌داند (۳۵). به‌طور کلی، هر دو فرمِ نانو و بالک اکسید منگنز موجب کاهش محتوای کلروفیل شدند، اما با توجه به مطالعه‌های انجام‌شده در این زمینه، مکانیسمِ عملِ آن‌ها یکسان نیست. نانوذرات اکسید منگنز به‌دلیل نسبت مساحت سطح به حجمِ بالا، نفوذپذیریِ بیشتر، واکنش‌پذیریِ بیشتر و آزادسازی سریع‌تر یون‌های Mn^{2+} را سریع‌تر آزادسازی می‌کنند. در مورد فرم بالک اکسید منگنز، یون‌های Mn^{2+} به آرامی آزاد می‌شوند و منجر به تنش اکسیداتیوِ طولانی‌تر، تخریب آرام و تدریجی در کلروپلاست‌های گیاهان می‌شود (۳۶). نتایجی که از بررسی و آنالیزِ پارامترهای مختلف در این مطالعه به دست آمد، اثبات‌کنندهٔ این فرضیه است که عملکرد گیاهان در برابر نانوذرات، متفاوت از ترکیبهای بالک آن است که این تفاوت در پاسخ‌دهی به‌دلیل ویژگی‌های ساختاری و شیمیاییِ متفاوت است. تفاوت در ساختارِ فیزیکی و شیمیاییِ نانوذرات با ترکیب‌های بالک آن‌ها بر روی میزانِ جذب و مکانیسمِ سیگنالینگ تأثیرگذار است. همچنین در مطالعه‌های اخیر، نانوذرات به‌دلیل ساختار ویژه‌ای که دارند از نظر زیستی نسبت به ترکیب‌های بالک فعال‌تر هستند (۳۷).

۵- نتیجه‌گیری

در انتها با درنظر گرفتن تمام نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه و مقایسه با بررسی‌های گذشته، این بررسی نشان‌دهندهٔ اثرهای وابسته به غلظت و فرم اکسید منگنز (Mn_2O_3) در هر دو فرم نانو و بالک بر رشد و فیزیولوژی گیاه خرفه است. نانوذرات اکسید منگنز در غلظت پایین‌تر (۱۰ میلی‌گرم در لیتر) می‌توانند به‌عنوان محرّک‌های زیستی عمل کنند و موجب تحریکِ جوانه‌زنی شوند، اما در غلظت‌های بالاتر اثرهای سمّی دارند. نتایج مطالعهٔ حاضر، یک عاملِ خارجیِ مؤثر و دارای پتانسیلِ امیدوارکننده‌ای را در مورداستفاده از نانوذرات اکسید منگنز در حیطهٔ نانوتکنولوژیِ گیاهی در کشاورزی نشان می‌دهد. نویسندگان پیشنهاد می‌دهند در مطالعه‌های آینده غلظت نانوذرات اکسید منگنز در محدودهٔ ۱۰-۵۰ میلی‌گرم در لیتر به‌کار رود و تأثیر زمان‌های مختلف پرایمینگ بذرها (۲، ۶، ۱۲ ساعت) بر جذب نانوذرات و بیان‌ژن‌های مرتبط با تنش اکسیداتیو نیز بررسی شود.

۶- ملاحظات اخلاقی

ندارد.

۷- تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از رسالهٔ دکتری مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می‌باشد. نویسندگان از تمامی پرسنل آزمایشگاه تحقیقات زیست‌شناسی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال صمیمانه تشکر می‌نمایند.

۸- تعارض منافع

نویسندگان اعلام می‌دارند تعارض منافعی ندارند.

۹- سهم نویسندگان

تمامی نویسندگان در طراحیِ پژوهش، جمع‌آوری و تحلیل‌داده‌ها و همچنین نگارش مقاله مشارکت داشته‌اند و نسخهٔ نهایی مقاله را تأیید نموده‌اند.

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

۱۰- منابع

1. Naik VV, Karadge BA. Effect of NaCl and Na2SO4 salinities and light conditions on seed germination of purslane (Portulaca oleracea Linn.). Journal of Plant Stress Physiology. 2017;3:1-4.
2. Noori Akandi Z, Makarian H, Pirdashti H, Amerian MR, Baradaran Firozabadi M, Tajik Ghanbary MA. Effect of foliar spraying of iron nanoparticles on improvement of some physiological and morphological traits of purslane (Portulaca oleracea) under cadmium stress. Journal of Plant Process and Function. 2020;9(35):127-43.
3. Simonet BM, Valcárcel M. Monitoring nanoparticles in the environment. Anal Bioanal Chem. 2009;393(1):17-21.
4. Dkhil MA, Moniem AEA, Al-Quraishy S, Saleh RA. Antioxidant effect of purslane (Portulaca oleracea) and its mechanism of action. Journal of Medicinal Plants Research. 2011;5(9):1589-93.
5. Noori Akandi Z, Makarian H, Pirdashti H, Amerian MR, Baradaran Firozabadi M, Tajik Ghanbary MA. Effect of foliar spraying of iron nanoparticles on improvement of some physiological and morphological traits of purslane (Portulaca oleracea) under cadmium stress. Plant Process and Function. 2020;9(35):127-43.
6. Kumar A, Sreedharan S, Singh P, Achigan-Dako EG, Ramchiary N. Improvement of a traditional orphan food crop, Portulaca oleracea L.(Purslane) using genomics for sustainable food security and climate-resilient agriculture. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2021;5:711820.
7. Santiago-Saenz YO, Hernández-Fuentes AD, Monroy-Torres R, Cariño-Cortés R, Jiménez-Alvarado R. Physicochemical, nutritional and antioxidant characterization of three vegetables (Amaranthus hybridus L., Chenopodium berlandieri L., Portulaca oleracea L.) as potential sources of phytochemicals and bioactive compounds. Journal of Food Measurement and Characterization. 2018;12:2855-64.
8. Liu P, Huang R, Hu X, Jia Y, Li J, Luo J, et al. Physiological responses and proteomic changes reveal insights into Stylosanthes response to manganese toxicity. BMC plant biology. 2019;19:1-21.
9. Alejandro S, Höller S, Meier B, Peiter E. Manganese in Plants: From Acquisition to Subcellular Allocation. Frontiers in Plant Science. 2020;11.
10. Santandrea G, Pandolfini T, Bennici A. A physiological characterization of Mn-tolerant tobacco plants selected by in vitro culture. Plant Science. 2000;150(2):163-70.
11. El-Keblawy A, Al-Ansari F. Effects of site of origin, time of seed maturation, and seed age on germination behavior of Portulaca oleracea from the Old and New Worlds. Canadian Journal of Botany. 2000;78(3):279-87.
12. Ahmar S, Mahmood T, Fiaz S, Mora-Poblete F, Shafique MS, Chattha MS, et al. Advantage of nanotechnology-based genome editing system and its application in crop improvement. Frontiers in Plant Science. 2021;12:663849.
13. Salehi H, Cheheregani Rad A, Raza A, Djalovic I, Prasad PV. The comparative effects of manganese nanoparticles and their counterparts (bulk and ionic) in Artemisia annua plants via seed priming and foliar application. Frontiers in Plant Science. 2023;13:1098772.
14. Qasim M, Akhtar W, Haseeb M, Sajjad H, Rasheed M. Potential role of nanoparticles in plants protection. Life Sci J. 2022;19(2):31-8.
15. Kralova K, Jampilek J. Responses of medicinal and aromatic plants to engineered nanoparticles. Applied Sciences. 2021;11(4):1813.
16. Velázquez-Gamboa MC, Rodríguez-Hernández L, Abud-Archila M, Gutiérrez-Miceli FA, González-Mendoza D, Valdez-Salas B, et al. Agronomic Biofortification of Stevia rebaudiana with Zinc Oxide (ZnO) Phytonanoparticles and Antioxidant Compounds. Sugar Tech. 2021;23(2):453-60.
17. Ranal M, Santana D. How and why to measure the germination process? Braz J Bot. Brazilian Journal of Botany. 2006;29.
18. Lichtenthaler HK. [34] Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in enzymology. 148: Elsevier; 1987. p. 350-82.
19. Adhikary S, Biswas B, Chakraborty D, Timsina J, Pal S, Chandra Tarafdar J, et al. Seed priming with selenium and zinc nanoparticles modifies germination, growth, and yield of direct-seeded rice (Oryza sativa L.). Scientific Reports. 2022;12(1):7103.

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]

20. Ziari Z, Tajadod G, Arbabian S, Mirzai M. The Effect of Manganese Oxide Nanoparticles and Zinc Oxide Nanoparticles on Seed Germination of Medicinal Chicory Plant Cichorium intybus L. Plant, Algae, and Environment. 2024;8(2):1366-74.
21. Munawar M, Ikram M, Iqbal M, Raza MM, Habib S, Hammad G, et al. Effect of seed priming with zinc, boron and manganese on seedling health in carrot (DaucuscarotaL.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 2013;5(22):2697.
22. do Espirito Santo Pereira A, Caixeta Oliveira H, Fernandes Fraceto L, Santaella C. Nanotechnology potential in seed priming for sustainable agriculture. Nanomaterials. 2021;11(2):267.
23. Khan T, Ullah N, Khan MA, Nadhman A. Plant-based gold nanoparticles; a comprehensive review of the decade-long research on synthesis, mechanistic aspects and diverse applications. Advances in colloid and interface science. 2019;272:102017.
24. Xu X, Chen X, Shi J, Chen Y, Wu W, Perera A. Effects of Manganese on Uptake and Translocation of Nutrients in a Hyperaccumulator. Journal of Plant Nutrition. 2007;30(10):1737-51.
25. Marschner H. Marschner's mineral nutrition of higher plants: Academic press; 2011.
26. Tian H, Ghorbanpour M, Kariman K. Manganese oxide nanoparticle-induced changes in growth, redox reactions and elicitation of antioxidant metabolites in deadly nightshade (Atropa belladonna L.). Industrial Crops and Products. 2018;126:403-14.
27. Khodakovskaya MV, Lahiani MH. Nanoparticles and Plants: From Toxicity to Activation of Growth. Handbook of Nanotoxicology, Nanomedicine and Stem Cell Use in Toxicology2014. p. 121-30.
28. Navarro E, Piccapietra F, Wagner B, Marconi F, Kaegi R, Odzak N, et al. Toxicity of Silver Nanoparticles to Chlamydomonas reinhardtii. Environmental Science & Technology. 2008;42(23):8959-64.
29. Alejandro S, Höller S, Meier B, Peiter E. Manganese in plants: from acquisition to subcellular allocation. Frontiers in plant science. 2020;11:300.
30. Millaleo R, Reyes-Díaz M, Ivanov A, Mora M, Alberdi M. Manganese as essential and toxic element for plants: transport, accumulation and resistance mechanisms. Journal of soil science and plant nutrition. 2010;10(4):470-81.
31. Pang C, Zhang W, Peng M, Zhao X, Shi R, Wu X, et al. Fine Mapping and Characterization of a Major Gene Responsible for Chlorophyll Biosynthesis in Brassica napus L. Biomolecules. 2022;12(3):402.
32. Hakala M, Rantamäki S, Puputti E-M, Tyystjärvi T, Tyystjärvi E. Photoinhibition of manganese enzymes: insights into the mechanism of photosystem II photoinhibition. Journal of Experimental Botany. 2006;57(8):1809-16.
33. Tezara W, Mitchell V, Driscoll S, Lawlor D. Water stress inhibits plant photosynthesis by decreasing coupling factor and ATP. Nature. 1999;401(6756):914-7.
34.Gong X, Wang Y, Liu C, Wang S, Zhao X, Zhou M, et al. Effects of manganese deficiency on spectral characteristics and oxygen evolution in maize chloroplasts. Biological trace element research. 2010;136:372-82.
35. Netto AT, Campostrini E, de Oliveira JG, Bressan-Smith RE. Photosynthetic pigments, nitrogen, chlorophyll a fluorescence and SPAD-502 readings in coffee leaves. Scientia horticulturae. 2005;104(2):199-209.
36. Fecht-Christoffers MM, Braun H-P, Lemaitre-Guillier C, VanDorsselaer A, Horst WJ. Effect of manganese toxicity on the proteome of the leaf apoplast in cowpea. Plant physiology. 2003;133(4):1935-46.
37. Moghaddasi S, Fotovat A, Khoshgoftarmanesh AH, Karimzadeh F, Khazaei HR, Khorassani R. Bioavailability of coated and uncoated ZnO nanoparticles to cucumber in soil with or without organic matter. Ecotoxicology and environmental safety. 2017;144:543-51.

[Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2026-11-28]