

غربال تولید اگزوپلی ساکاریدهای متصل به سلول و رها شده به محیط در باسیلوس های جدا شده از مرغ داری های اراک

سرور مبینی^۱، مریم تاج آبادی ابراهیمی^۲، مریم هاشمی^۳، پروانه جعفری^۴

^۱ کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.
^۲ استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
^۳ استادیار، موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (Aabrii)، کرج، ایران
^۴ استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

سابقه و هدف: اگزوپلی ساکاریدها پلی مرهای طبیعی هستند که بوسیله باکتری های مختلف مانند باکتری های اسیدلاکتیک، بیفیدوباکتریوم ها و باسیلوس ها تولید می شوند. به علت خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها، به طور گسترده در صنایع غذایی به عنوان عوامل ویسکوزیته کننده، ژله ای کننده و قوام دهنده استفاده می شوند. از آن جایی که اگزوپلی ساکاریدهای تولیدی به وسیله سویه های باسیلوس ویسکوزیته و خواص سود و پلاستیک بالایی دارند، امروزه مورد توجه محققین قرار گرفته اند. هدف این تحقیق، بررسی میزان تولید پلی ساکارید خارج سلولی و اگزوپلی ساکارید متصل به سلول در ۱۰ جدایه باسیلوس جدا شده از مرغ داری ها و تعیین جدایه برتر بر اساس تولید اگزوپلی ساکارید می باشد.

مواد و روش ها: ۱۰ جدایه باسیلوس در محیط MRS جامد به همراه ۲٪ (w/v) گلوکز کشت داده شده، در شرایط هوازی و دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴-۴۸ ساعت گرم خانه گذاری شدند. سپس تولید اگزوپلی ساکارید در آن ها (به صورت متصل شده^۱ و رها شده در محیط^۲) با روش فتل/سولفوریک اندازه گیری شد. به منظور بررسی کمی تولید اگزوپلی ساکارید، با مقایسه منحنی استاندارد گلوکز و نتایج به دست آمده، میزان تولید آن بر حسب میلی گرم بر لیتر تعیین شد.

یافته ها: از بین ۱۰ جدایه باسیلوس، ۲ سویه بیشترین توانایی تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده را داشتند، که بیشینه تولید، ۴۳ میلی گرم بر لیتر (B5) و کمینه تولید، ۱۲ میلی گرم بر لیتر (B4، B10 و B9 و B1 و B8) بود. تمامی جدایه های مورد بررسی، اگزوپلی ساکارید رها شده در محیط تولید می کردند که در مورد آن ها بیشینه تولید ۲۲۹ میلی گرم بر لیتر (BY) و کمینه تولید ۴۵ میلی گرم بر لیتر (B8) بود. هم چنین کینتیک رشد و کینتیک تولید اگزوپلی ساکارید جدایه منتخب (BY)، در زمان های مختلف تعیین گردید. با مقایسه هر دو منحنی رشد باکتری و تولید اگزوپلی ساکارید رها شده و متصل شده، می توان نتیجه گرفت که جدایه BV بیشترین تولید اگزوپلی ساکارید رها شده و متصل شده را در اواسط فاز لگاریتمی نشان می داد و پس از آن میزان تولید ثابت می ماند.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که پتانسیل تولید ترکیبات اگزوپلی ساکارید توسط گونه های باسیلوس بومی ایران وجود دارد.

کلمات کلیدی: اگزوپلی ساکارید، باکتری های اسیدلاکتیک، باسیلوس، کینتیک رشد

مقدمه

پلی ساکاریدها گروه های پلی مری بسیار متغیری هستند.

نویسنده مسئول: گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

Email: m.tajabadi@iauctb.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله: ۹۰/۱۲/۱۴

تاریخ پذیرش: ۹۱/۰۲/۰۳

مشخصات ساختاری آن ها مانند وزن مولکولی، تعداد و اتصالات ساکاریدی، نقش مهمی در کاربرد وسیع آن ها در صنایع مختلف دارد. بسیاری از پلی ساکاریدهای مشتق از گیاهان مانند نشاسته

1- EPS-b: Bounded EPS

2- EPS-r: Released EPS

حائز اهمیت است.

مواد و روش‌ها

باکتری‌ها و شرایط رشد

در این تحقیق از ۱۰ جدایه باسیلوس جدا شده از مرغ‌داری‌ها استفاده شد. این باکتری‌ها در کلکسیون میکروبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در دمای ۸۰- درجه سانتی‌گراد و زیر ۲۵٪ گلیسرول نگهداری می‌شوند. قبل از انجام هر آزمون این باکتری‌ها در محیط، MRS^۲ مایع به همراه ۲٪ (وزنی-حجمی) گلوکز در شرایط هوازی و دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸-۲۴ ساعت کشت داده شدند. سپس برای تهیه عکس میکروسکوپی بر روی محیط MRS جامد کشت داده شدند.

تست‌های بیوشیمیایی

تست‌های بيو شیمیایی تولید کاتالاز، تست وژ- پروسکوئر و متیل رد، تخمیر قند، تست حرکت، احیاء نیتريت به نترات، هیدرولیز نشاسته و تجزیه کازئین بر اساس کتاب برجی انجام گرفت (۲).

بررسی تولید اگزوپلی ساکارید

در این بررسی اگزوپلی ساکارید متصل به سلول و اگزوپلی ساکارید ترشح شده در محیط کشت به‌طور جداگانه استخراج شد و در مقایسه با استاندارد گلوکز تعیین کمیت گردید. به‌این منظور از کشت ۲۴ ساعته هر جدایه به‌میزان ۱٪ به محیط MRS مایع تلقیح و ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و شرایط هوازی گرم‌خانه‌گذاری شد. سپس محیط‌های کشت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۳۰ دقیقه سانتریفوژ (۱۵۰۰۰g) شدند. مایع رویی برای جدا سازی اگزوپلی ساکارید رها شده در محیط کشت و ته‌نشست برای جدا سازی اگزوپلی ساکارید متصل شده استفاده شد (۱۰).

جداسازی اگزوپلی ساکاریدهای متصل شده به سلول

به ته‌نشست حاوی سلول‌های باکتریایی ۵ میلی‌لیتر محلول سرم فیزیولوژی برای شستشو اضافه شد. سپس به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفوژ (۱۵۰۰۰g) شد. به ته‌نشست ۲ بار EDTA ۰/۰۵ مولار اضافه کرده و ۴ ساعت در

پکتین و صمغ به‌عنوان عوامل قوام‌دهنده، ژله‌ای کننده، مورد استفاده قرار می‌گیرند، در دهه‌های اخیر اگزوپلی ساکاریدهای میکروبی جایگزین پلی ساکاریدهای گیاهی شده‌اند که از خواص فوق‌برخوردار بوده و به مقدار فراوان و با درجه خلوص بالاتری به‌دست می‌آیند. اگزوپلی ساکاریدها در هنگام رشد باکتری‌ها به وسیله باکتری‌های مختلف مانند باکتری‌های اسیدلاکتیک، بیفیدوباکتریوم‌ها و باسیلوس‌ها تولید می‌شوند. پلی ساکاریدهای میکروبی بسته به موقعیت قرارگیری آن‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند (۶)

۱- پلی ساکاریدهای کپسولی^۱ که در سطح سلول قرار می‌گیرند و نقش مهمی در حفاظت میکروب‌ها در برابر حمله‌ی فاژها، فاگوسیتوز، ترکیبات سمی و آنتی‌بیوتیک‌ها دارند.

۲- پلی ساکاریدهای خارج سلولی^۲ که به خارج سلول ترشح می‌شوند. توانایی تولید اگزوپلی ساکارید در میان باکتری‌ها بیشتر از قارچ‌ها و مخمرها می‌باشد. اگزوپلی ساکاریدها خود به دو گروه (متصل شده و رها شده در محیط) تقسیم می‌شوند. (۶).

هر کدام از اگزوپلی ساکاریدهای متصل شده و رها شده در محیط دارای مزایای منحصر به فردی هستند، به‌طور مثال اگزوپلی ساکاریدهای رها شده، از سلول‌ها در مقابل نیسین و مس محافظت می‌کنند (۷). به علت خواص فیزیکی و شیمیایی، اگزوپلی ساکاریدها به‌طور گسترده در صنایع غذایی به‌عنوان عوامل ویسکوزیته‌کننده، ژله‌ای کننده و قوام‌دهنده استفاده می‌شوند. از دیگر موارد استفاده اگزوپلی ساکاریدها به‌عنوان عوامل حذف فلزات سنگین، در صنایع داروسازی به‌عنوان عوامل انتقال دارو استفاده می‌شوند. از اثرات بیولوژیکی آن‌ها می‌توان به خواص ضد سرطانی، ضد ویروسی، ضد التهابی، کاهش‌دهنده کلسترول خون، کاهش‌دهنده قند خون اشاره کرد، هم‌چنین می‌توانند در دستگاه گوارش پایدار مانده و اثر پری بیوتیکی داشته باشند (۳). هدف از این تحقیق بررسی میزان تولید پلی ساکارید خارج سلولی و اگزوپلی ساکارید متصل به سلول در ۱۰ جدایه باسیلوس بالقوه پروبیوتیک جدا شده از مرغ‌داری‌های اراک است (۱). از آن‌جا که تولید اگزوپلی ساکاریدها در جدایه‌های مختلف باسیلوس متغیر می‌باشند، لذا انتخاب جدایه‌ای که بیشترین میزان تولید را دارد، از نظر تکنولوژی تولید و خواص عملکردی

1- Capsular poly saccharide(CPS)

2- Exopolysaccharide(EPS)

3- Man Rogosa and Sharp3-

دمای ۴ درجه سانتی‌گراد بر روی شیکر قرار داده شد. به منظور جدا کردن مواد نامحلول سوسپانسیون به مدت ۳۰ دقیقه و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفوژ شد (۶۰۰۰g). به منظور رسوب آگزوپلی‌ساکارید متصل شده به مایع شفاف رویی حاصل از سانتریفوژ، اتانل سرد اضافه شد. عمل رسوب‌سازی آگزوپلی‌ساکارید متصل شده به مدت ۲۴ ساعت و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد انجام شد. برای جداسازی آگزوپلی‌ساکارید رسوب‌یافته از سانتریفوژ (۶۰۰۰g) در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و زمان ۳۰ دقیقه استفاده شد. در این مرحله مایع شفاف رویی دور ریخته شد و ته نشست حاوی آگزوپلی‌ساکارید متصل شده در محیط آزمایشگاه خشک گردید. به منظور اطمینان از نتایج تمام آزمایشات ۳ بار تکرار شد (۱۰).

جداسازی آگزوپلی‌ساکارید رها شده در محیط

برای جداسازی آگزوپلی‌ساکاریدهای آزاد شده در محیط کشت، مایع رویی به دست آمده از ۱۰ میلی‌لیتر نمونه سانتریفوژ و سپس با تری‌کلرواستیک اسید با غلظت ۲۰ درصد عمل‌آوری شد و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ ساعت بر روی شیکر قرار داده شد. پروتئین‌های ته‌نشین شده پس از ۲۰ دقیقه از طریق سانتریفوژ (۲۵۰۰۰g) جداگردید. سپس به منظور رسوب آگزوپلی‌ساکارید رها شده به مایع شفاف رویی حاصل از سانتریفوژ اتانل سرد اضافه شد. عمل رسوب‌سازی آگزوپلی‌ساکارید رها شده به مدت ۲۴ ساعت و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد انجام شد. برای جداسازی آگزوپلی‌ساکارید رسوب یافته از سانتریفوژ (۶۰۰۰g) در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد و زمان ۳۰ دقیقه استفاده شد و ته نشست حاوی آگزوپلی‌ساکارید رها شده در محیط آزمایشگاه خشک شد. به منظور اطمینان از نتایج تمام آزمایشات ۳ بار تکرار شدند (۱۰).

سنجش کمی آگزوپلی‌ساکارید متصل‌شده با روش فنل /

اسیدسولفوریک، اسپکتروفوتومتری

مقدار کلی کربوهیدرات، از طریق روش فنل / اسید سولفوریک و روش گلوکز به عنوان استاندارد تعیین‌شد. بدین ترتیب که رسوب آگزوپلی‌ساکارید در ۱ میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه حل شد. سپس ۰/۵ میلی‌لیتر ته‌نشین حاوی آگزوپلی‌ساکارید محلول در آب مقطر، ۰/۵ میلی‌لیتر فنل ۵ درصد و ۲/۵

میلی‌لیتر اسیدسولفوریک غلیظ اضافه گردید، سپس محلول به خوبی مخلوط شده و پس از این‌که دمای آن به دمای اتاق رسید با اسپکتروفوتومتر در طول موج ۴۹۰ نانومتر میزان جذب نمونه‌ها خوانده شد (۱۰). با استفاده از منحنی استاندارد گلوکز، انتخاب برترین جدایه تولیدکننده آگزوپلی‌ساکارید در دو حالت متصل‌شده و رها شده انجام‌گرفت. در این روش جهت تهیه محلول استوک گلوکز ۱۰ میلی‌گرم آلفا-D-گلوکز در ۸۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل و ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول استوک گلوکز تهیه گردید. پس از افزودن غلظت‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۸، ۱۰ و ۲۰ میلی‌لیتر از محلول استوک گلوکز به بشرهای مختلف حجم نهایی محلول به ۲۰ میلی‌لیتر رسید. از هر بشر ۰/۵ میلی‌لیتر محلول داخل لوله آزمایش ریخته و به هر لوله ۰/۵ میلی‌لیتر فنل و ۲/۵ میلی‌لیتر اسیدسولفوریک غلیظ اضافه‌کردیم و پس از مخلوط کردن و هم‌دما شدن با دمای محیط با اسپکتروفوتومتر در طول موج ۴۹۰ جذب نمونه‌ها خوانده شد و منحنی استاندارد گلوکز در نرم‌افزار Excell رسم گردید. مقدار کلی کربوهیدرات به کمک منحنی استاندارد گلوکز برحسب میلی‌گرم گلوکز در هر لیتر از محیط کشت بیان شد (۵).

تعیین کینتیک رشد جدایه‌ی منتخب (BY)

برای تعیین کینتیک رشد جدایه‌ی منتخب (BY)، همانند قبل به حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر محیط کشت در ارلن کشت داده شد. در فواصل زمانی معین هر ۱ ساعت نمونه برداری صورت‌گرفت و جذب نوری (A_{۶۰۰}) اندازه‌گیری شد. بدین ترتیب الگوی رشدی جدایه‌های مورد تحقیق در زمان‌های مختلف تعیین گردید. (۴).

تعیین کینتیک تولید آگزوپلی‌ساکارید

برای تعیین کینتیک تولید آگزوپلی‌ساکارید هم‌زمان با تعیین کینتیک رشد باکتری مورد نظر در ساعت‌های متوالی، ۲ میلی‌لیتر از نمونه‌ها را در هر ساعت جمع‌آوری نموده و سپس با روش فنل سولفوریک مقدار آگزوپلی‌ساکارید تولید شده در هر ساعت تعیین و به کمک منحنی استاندارد گلوکز میزان کربوهیدرات تولید شده در هر ساعت اندازه‌گیری شده و به کمک نرم‌افزار Excell منحنی مربوط به کینتیک تولید آگزوپلی‌ساکارید رسم گردید (۴).

یافته ها

تمامی ۱۰ جدایه‌ی باسیلوس از نظر وجود کاتالاز، مثبت بودند و بررسی لام گرم زیر میکروسکوپ نشان دهنده‌ی باسیل‌های گرم مثبت بود. نتایج تست‌های بیوشیمیایی در جدول ۱ ذکر شده‌است.

جداسازی اگزوپلی ساکاریدهای متصل شده به سلول

از ۱۰ جدایه باسیلوس مورد تحقیق ۲ جدایه توانایی تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده بیشتری نسبت به بقیه جدایه‌ها داشتند، بیشترین میزان تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده به جدایه B5 (۴۳ میلی گرم بر لیتر) و کمترین میزان به جدایه‌های B1، B8، B9 و B10 (۰/۲ میلی گرم بر لیتر) تعلق داشت (نمودار ۱) (جدول ۲).

جداسازی اگزوپلی ساکاریدهای رها شده در محیط

از ۱۰ جدایه باسیلوس مورد آزمایش همه جدایه‌ها قادر به تولید


اگزوپلی ساکارید رها شده در محیط بودند که از بین آن‌ها، بیشترین میزان تولید مربوط به نمونه BV (۲۲۹ میلی گرم بر لیتر) و کمترین میزان تولید مربوط به نمونه B8 (۴۵ میلی گرم بر لیتر) گزارش شد (نمودار ۱) (جدول ۲).
از فرمول حاصل از رسم منحنی استاندارد گلوکز برای محاسبه میزان اگزوپلی ساکارید تولیدی (متصل شده و رها شده در محیط) استفاده شد (نمودار ۲). شد. منحنی رشد جدایه منتخب در نمودار ۳ آورده شده‌است.

تعیین کینتیک رشد جدایه‌ی منتخب (B_v)

آگاهی از روند کینتیک رشد باکتری و مقایسه آن با روند تولید اگزوپلی ساکارید، جهت بهینه‌سازی و انجام آزمون‌های تکمیلی ضروری است. در این مطالعه کینتیک رشد جدایه B_v که با بیشترین میزان تولید اگزوپلی ساکارید بررسی شد. منحنی رشد جدایه منتخب در نمودار ۳ آورده شده است.

جدول ۱- نتایج آزمون‌های بیوشیمیایی در ۱۰ جدایه باسیلوس


MR	VP	سیترات	حرکت	تولید گاز H ₂ S	گزیلوز	نشاسته	آرابینوز	گلوکز	کد ایزوله‌ها
-	+	+	+	-	+	+	+	+	B1
-	+	+	+	-	-	+	-	+	B2
-	+	+	+	+	+	+	+	+	B3
-	+	+	+	-	+	+	+	+	B4
-	+	+	+	-	+	+	+	+	B5
+	+	-	+	-	-	+	-	+	B6
-	+	+	+	-	+	+	+	+	B7
-	+	+	+	-	+	+	+	+	B8
+	+	+	+	-	+	+	+	+	B9
-	+	+	+	-	+	+	+	+	B10



نمودار ۱- میزان تولید آگزوپلی ساکارید متصل شده و رها شده در ۱۰ جدایه باسیلوس

جدول ۲- میزان آگزوپلی ساکارید متصل شده و آگزوپلی ساکارید رها شده بر حسب mg/l در ۱۰ جدایه باسیلوس

ردیف	کد جدایه	آگزوپلی ساکارید متصل شده mg/l	آگزوپلی ساکارید رها شده mg/l
۱	B۷	۷/۴	۲۲۹
۲	B۲	۳۳	۱۴۹
۳	B۵	۴۳	۱۳۹
۴	B۶	۲/۸	۱۳۹
۵	B۳	۱	۱۲۵
۶	B۴	۰/۴	۱۱۳
۷	B۱۰	۰/۲	۶۹
۸	B۹	۰/۲	۶۵
۹	B۱	۰/۲	۵۲
۱۰	B۸	۰/۲	۴۵




نمودار ۲- منحنی استاندارد گلوکز.

اگزوپلی ساکارید را تحت تاثیر قرار نداده است (نمودار ۳).

تعیین کینتیک تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده در جدایه B_p

تعیین کینتیک تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده هم زمان با کینتیک تولید اگزوپلی ساکارید رها شده جدایه منتخب انجام گرفت. با مقایسه هر دو منحنی رشد باکتری و تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده می توان نتیجه گرفت که این جدایه بیشترین تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده را در

تعیین کینتیک تولید اگزوپلی ساکارید رها شده در جدایه B_p برای تعیین کینتیک تولید اگزوپلی ساکارید در فازهای مختلف رشدی، آگاهی از کینتیک رشد الزامی است. تعیین کینتیک تولید اگزوپلی ساکارید هم زمان با کینتیک رشد جدایه انجام گرفت. با مقایسه هر دو منحنی رشد باکتری و تولید اگزوپلی ساکارید رها شده می توان نتیجه گرفت که این جدایه بیشترین تولید اگزوپلی ساکارید رها شده را در اواسط فاز لگاریتمی داشته است (۶/۷ میلی گرم بر لیتر) که پس از آن میزان تولید ثابت مانده است. میزان رشد باکتری، غلظت



نمودار ۳- نمودار کینتیک رشد و کینتیک تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده و رها شده جدایه B_p

میزان امواج صوتی از سلول جدا می شدند (۱۱). افزودن EDTA به رسوب حاصل از سانتریفوژ سبب جدا شدن اگزوپلی ساکارید متصل شده می شود. این مسئله نشان دهنده وجود اتصال ضعیف (به جای اتصال کووالانت) پلی ساکارید به سلول می باشد (مانند پیوندهای یونی و یا هیدروژنی) که ای جی ویکن و همکارانش در سال ۱۹۸۳ متذکر شدند (۱۲). در این تحقیق نیز افزودن EDTA سبب جدا شدن اگزوپلی ساکارید متصل شده گردید که می تواند دلیل بر اتصالات ضعیف آن با سلول باشد. مطالعاتی که لوی جستن و همکارانش در سال ۲۰۰۱ بر روی

اواسط فاز لگاریتمی داشته است (۵ / ۵ میلی گرم بر لیتر) که پس از آن میزان تولید ثابت مانده است (نمودار ۳).

بحث

در تحقیق حاضر، ۱۰ جدایه باسیلوس بالقوه پروبیوتیک (۱)، جدا شده از مرغ داری های اراک، از نظر ت اگزوپلی ساکارید شناسایی نماییم. تمام جدایه ها توانایی تولید هر دو نوع اگزوپلی ساکارید را داشتند. اگزوپلی ساکارید متصل شده می تواند قابل مقایسه با پلی ساکاریدهای کپسولی که، ویدفیلد و همکارانش در سال ۱۹۹۸ تعریف کردند باشد. زیرا با کمترین

سویه لاکتوکوکوس لاکتیس انجام دادند، نشان داد که این سویه هر دو پلی ساکارید متصل شده و رها شده را تولید می کند که پلی ساکارید متصل شده سلول ها را در مقابل باکتروفاژها و لیزوزیم حفاظت کرده و پلی ساکارید رها شده سلول ها را در مقابل مس و نیسین حفاظت می کند (۷). لذا در این بررسی تولید هر دو نوع اگزوپلی ساکارید متصل و رها شده در محیط بررسی شد. میزان تولید اگزوپلی ساکارید بسته به شرایط محیط کشت و کربوهیدرات موجود در محیط کشت متفاوت می باشد. به عنوان مثال در تحقیقی که آی وی لی و همکارانش در سال ۱۹۹۷ انجام دادند با بهینه سازی شرایط توانستند از سویه باسیلوس پلی میکسا بیشترین میزان تولید اگزوپلی ساکارید (۵۴g/l) را داشته باشند. آن ها در تحقیق خود دریافتند که افزایش غلظت ساکارز به عنوان منبع کربن و نیترا ت پتاسیم به عنوان منبع نیتروژن بیشترین تولید اگزوپلی ساکارید را خواهد داشت. از سوی دیگر جی اف بور جیو و همکارانش در سال ۲۰۰۹ در یافتند که بیشترین تولید اگزوپلی ساکارید توسط سویه باسیلوس در محیط فاقد نیتروژن می باشد (۸). در تحقیقی که سندرا لارپین و همکارانش در سال ۲۰۰۲ انجام دادند ۲٪ گلوکز به محیط افزودند (۶). در این نیز تحقیق با افزودن ۲٪ گلوکز به محیط کشت، میزان گلوکز محیط (به عنوان منبع کربن) را افزایش دادیم. مورنو و همکارانش در سال ۱۹۹۹ دریافتند که تولید اگزوپلی ساکارید در بیشتر باکتری ها بعد از توقف رشد افزایش می یابد (۹). از سوی دیگر ماریاسی و همکارانش در سال ۱۹۹۶ دریافتند که بیشترین تولید اگزوپلی ساکارید در فاز سکون بوده، زمانی که پارامترهای فیزیولوژیکی مانند (اکسیژن، PH) برای تولید بیومس در بالاترین مقدار خود بوده است (۸). در این تحقیق با توجه به شرایط ایجاد شده حداکثر تولید اگزوپلی ساکارید رها شده در انتهای فاز لگاریتمی بوده و حداکثر تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده نیز در انتهای فاز لگاریتمی بوده است. در تحقیقی که ریچارد تالون و همکارانش در سال ۲۰۰۳ انجام دادند دریافتند که سویه لاکتوباسیل پلان تارم ۵۶EP هر دو اگزوپلی ساکارید را تولید می کند، بیشترین مقدار اگزوپلی ساکارید متصل ۷۳/۶ میلی گرم بر لیتر در ابتدای فاز

لگاریتمی بوده است و بیشترین مقدار اگزوپلی ساکارید رها شده در همان ساعت (ساعت ۲۵) ۳۶/۸ میلی گرم بر لیتر رسیده است (۱۰). در این تحقیق مقدار اگزوپلی ساکارید متصل شده از ساعت ۱۶-۱ افزایش یافته و به بیشترین مقدار خود (۵/۵) میلی گرم بر لیتر) در انتهای فاز لگاریتمی رسیده است، در حالی که در اگزوپلی ساکارید رها شده از ساعت ۱۴-۱ افزایش یافته و به بیشترین مقدار خود (۶/۷) میلی گرم بر لیتر) در انتهای فاز لگاریتمی رسیده است. مقدار اگزوپلی ساکارید متصل شده از ساعت ۱۶-۱۴ کاهش یافته در حالی که مقدار اگزوپلی ساکارید رها شده در همان ساعت افزایش یافته و به حداکثر مقدار خود رسیده است و بعد از آن مقدار هر دو، تا ساعت ۲۴ ثابت مانده است.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعات نشان داد که باسیلوس های بالقوه پروبیوتیک جدا شده از مرغ داری ها در این تحقیق توانایی تولید اگزوپلی ساکارید به صورت آزاد و متصل شده را دارند. جدایه برتر (B_۷) بیشترین میزان تولید اگزوپلی ساکارید را داشته که حداکثر تولید در انتهای فاز لگاریتمی بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که پتانسیل تولید ترکیبات اگزوپلی ساکارید توسط گونه های باسیلوس بومی ایران وجود دارد.

تشکر و قدردانی

این مطالعه با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان انجام شده است که بدین وسیله از مسئولین و همکاران محترم این حوزه تشکر و قدردانی می شود.

منابع

- (۱) جعفری پ، تاج آبادی ابراهیمی م، رضائی ش. بررسی ضد میکروبی سویه های بومی جدا شده از مرغ داری های اراک، فصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. ۱۳۸۹؛ سال سوم، شماره نهم: ۲۶-۲۱.
- (2) Breed RS, Murray EGD, Smith NR. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, Williams and Wilkins, Baltimore, 1957; 1:613-694.
- (3) Chunhui Liu, Juan Lu, Lili Lu, Yuhong Liu, Fengshan Wang, Min Xiao, Isolation, Structural Characterization and Immunological Activity of an Exopolysaccharide Produced by *Bacillus licheniformis* 8-37-0-1, Bioresource Technology, 2010; 101:5528-5533.
- (4) Dubois M, Gilles KA, Hamilton JK, Rebers PA, Smith V. Calorimetric Method for Determination of Sugars and Related substances. Anal Chem, 1956; 28:350-356.
- (5) Konemanw A, Stephan D. Color Atlas and Text Book of Diagnostic Microbiology, Fifth Philadelphia Newyork, 2002; 13:171-241.
- (6) Larpin S, Sauvageot Ns, Pichereau V, Laplace JM, Auffray Yk. Biosynthesis of Exopolysaccharide by *Bacillus licheniformis* Strain Isolated from Ropy Cider. Int J Food Microbiol, 2002; 77:1-9.
- (7) Looijesteijn PL, Trapet L, De Vries E, Abee T, Hugenholtz J. Physiological Function of Exopolysaccharides Produced by *Lactococcus lactis*. Int J Food Microbiol, 2001; 64:71-80.
- (8) Manca MC, Lama L, Improta R, Esposito E, Gambacorta A, Nicolaus B. Chemical Composition of Two Exopolysaccharides from *Bacillus thermoantarcticus*. Appl Environ Microbiol, 1996; 62(9): 3265-3269.
- (9) Moreno J, Vargas-García C, López MJ, Sánchez-Serrano G. Growth and Exopolysaccharide Production by *Azotobacter Vinelandii* In Media Containing Phenolic Acids. J Appl Microbiol, 1999; 86: 439-445.
- (10) Tallon R, Bressollier P, Urdaci MC. Isolation and Characterization of Two Exopolysaccharides Produced by *Lactobacillus plantarum* EP56. Res Microbiol, 2003; 154:705-712.
- (11) Whitfield C. Bacterial Extracellular Polysaccharides, Can J Microbiol, 1998; 34:415-420.
- (12) Wicken AJ, Ayres A, Campbell LK, Knox KW. Effect of Growth Conditions on Production of Rhamnose-Containing Cell Wall and Capsular Polysaccharides by Strains of *Lactobacillus casei* subsp. *Rhamnosus*. J Bacteriol, 1983; 153: 84-92.