

تشخیص مولکولی فوزاریوم سولانی در نمونه‌های مشکوک به کراتیت هرپسی

آتوسا فردوسی^{۱*}، محمد حسن شاه حسینی^۲، منصور بیات^۳، سید جمال هاشمی^۴، محمد قهری^۵

۱. دانشجوی دکتری، گروه تخصصی پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

۲. دانشیار، گروه میکروبیولوژی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۳. مؤسس، مؤسسه ایرانیان ژن فناوری (IGF)، تهران، ایران

۴. دانشیار، گروه تخصصی پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

۵. استاد، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۶. استاد یار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: فوزاریوم سولانی می‌تواند به صورت توام در کراتیت‌های هرپتیک حضور یابد. به‌علاوه نمای بالینی این دو کراتیت به‌علت تشابه، باعث خطای تشخیص تمایزی می‌شود. هدف این مطالعه تشخیص حضور فوزاریوم سولانی در نمونه‌های مشکوک به کراتیت هرپتیک به‌عنوان عامل اصلی یا عفونت همراه می‌باشد.

مواد و روش‌ها: ۱۰۰ نمونه DNA استخراج شده، از موارد بالینی مشکوک به کراتیت هرپتیک (شامل ۶۵ نمونه منفی از نظر عفونت HSV، و ۳۵ نمونه مثبت) انتخاب گردید. به‌منظور تشخیص فوزاریوم سولانی در این نمونه‌ها، تست PCR با پرایمرهای اختصاصی ffuso1 و rfuso2 و ژن هدف سیتوکروم بی میتوکندریایی با محصول ۳۳۰ bp بهینه گردید. ویژگی و حساسیت تست مورد ارزیابی قرار گرفت و محصول PCR به روش T/A Cloning کلون گردید.

یافته‌ها: در میان ۶۵ نمونه منفی از جهت HSV، دو نمونه از نظر فوزاریوم سولانی مثبت بوده و محصول ۳۳۰ bp در آن‌ها تکثیر شد. حساسیت تست در حد یک کپی از DNA فوزاریوم سولانی و ویژگی آن ۱۰۰٪ تعیین گردید.

بحث: نتایج تست PCR نشان داد که برخی از کراتیت‌های مشکوک به هرپتیک، ناشی از فوزاریوم سولانی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: تشخیص دقیق عامل اتیولوژیک در موارد تشابه نمای بالینی و نیز در عفونت‌های توام از طریق روش‌های مولکولی میسر است.

کلمات کلیدی: کراتیت، فوزاریوم سولانی، پی سی آر، هرپس سیمپلکس ویروس

مقدمه

دقیق و درمان ارگاناسم مسبب، تأخیر و خطا وجود داشته باشد، پیامدهای این عفونت بعضاً غیر قابل جبران خواهد بود. عامل عفونت کراتیتی بسته به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و نیز فاکتورهای خطری که بیمار با آن مواجه بوده است، متفاوت می‌باشد. در طی سه دهه اخیر شیوع کراتیت‌های قارچی رشد فزاینده‌ای داشته است و دلیل اصلی آن عوامل زمینه‌ساز و ریسک فاکتورهای است که در پرونده اکثر بیماران جلب توجه می‌نماید (۱، ۲). ارگاناسم‌های قارچی عامل ۱/۲ درصد تا ۶۲ درصد از موارد عفونت‌های کراتیتی بوده اند

کراتیت یا عفونت چرکی قرنیه چشم، در جهان یکی از اصلی ترین عواملی است که باعث تاری دید، نابینایی و یا حتی از دست دادن کامل چشم می‌شود. خصوصاً زمانی که در تشخیص

*نویسنده مسئول: آتوسا فردوسی

پست الکترونیکی: Atousaferdousi@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

(3,4,5,6,7,8) وفوزاریوم شایع‌ترین جنس عامل مایکوکراتیت است که اکثراً در نواحی حاره و تحت حاره از چشم ایزوله می‌گردد (2,4,17,21). گونه‌های فوزاریوم به‌طور شایع در خاک، اکوسیستم‌های آبی نظیر دریاها و رودخانه‌ها، گیاهان و بقایای مواد آلی در حال فساد یافت می‌شوند. برخی از این گونه‌ها پاتوژن گیاهی هستند و برخی دیگر به صورت ساپروفیت در محیط حضور دارند. شایع‌ترین گونه جنس فوزاریوم که هم‌چنین در میان گونه‌های این جنس از بیشترین ویروانس نیز برخوردار می‌باشد، فوزاریوم سولانی است (21). فوزاریوم سولانی علاوه بر این که می‌تواند به تنهایی عامل کراتیت باشد، در برخی دیگر از موارد می‌تواند به صورت عفونت مخلوط و توأم همراه با باکتری‌های جنس استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس و یا ویروس هرپس سیمپلکس در ضایعات قرنیه چشم یافت شود (۴,۶,۸). نمای بالینی کراتیت‌های قارچی بسیار پلی مرفیک می‌باشد. در مراحل اولیه ضایعات به شکل زخم‌های دندریتیک در قرنیه ظاهر می‌شوند، که بسیار شبیه زخم‌های دندریتیک ناشی از هرپس سیمپلکس ویروس است. در نتیجه گاهی در تشخیص تمایزی این دو عامل خطا بروز می‌کند و داروهای آنتی ویرال و یا کورتیکواستروئیدی به بیمار تجویز می‌گردد. در این شرایط نه تنها بهبودی در وضعیت بیمار مشاهده نمی‌شود، بلکه حتی شرایط رو به وخامت می‌رود. در این موارد حتی اگر عامل ضایعه هرپس سیمپلکس ویروس باشد، با مصرف داروهای استروئیدی شرایط برای حضور عوامل قارچی نیز فراهم می‌گردد و در صورتی که تشخیص خطا بوده و عامل کراتیت، ارگانیسم قارچی باشد، با مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، زمینه برای رشد وسیع‌تر قارچ و گسترش ضایعه کاملاً مهیا می‌گردد (۴,۶,۸,۱۴). بنابراین شناسایی سریع و دقیق عامل عفونت، و تشخیص قطعی این که آیا ارگانیسم‌های دیگری نیز به عنوان عوامل همراه در عفونت حضور دارند یا خیر، در روند درمان بسیار تعیین کننده خواهد بود. تشخیص بر مبنای روش‌های مرسوم نظیر کشت و مشاهده میکروسکوپی با موانع متعددی مواجه می‌باشد. زیرا میزان نمونه‌ای که می‌توان از تراشه‌های قرنیه به‌دست آورد بسیار ناچیز بوده، و بعضاً ممکن است حضور ارگانیسم در این حجم جزئی از نمونه قابل پیگیری نباشد و عامل اتیولوژیک در حیطه دید میکروسکوپی ظاهر نشود. از سوی دیگر چون زمانی در حدود ۳ الی ۷ روز برای رشد کلنی و پدیدار شدن ماکروکنیدی‌های دوکی شکل به عنوان کلید تشخیص جنس فوزاریوم، لازم است، در روند تشخیص بر اساس کشت و به

دنبال آن در فرایند درمان تأخیر زیادی بروز می‌نماید (9,12,17,20). به‌علاوه چنانچه عفونت از نوع توأم ویروسی و قارچی باشد، با روش‌هایی نظیر کشت و مشاهده میکروسکوپی نمی‌توان حضور همزمان این عوامل را شناسایی نمود. تکنیک‌های مولکولی نظیر PCR علاوه بر سرعت و دقت، این امکان را فراهم می‌آورند تا در زمانی کوتاه بتوان وجود چندین عامل اتیولوژیک را به‌صورت همراه در نمونه‌های مشکوک مورد بررسی قرار داد (4,5,7,9,19). هدف این مطالعه طراحی و بهینه کردن تکنیک PCR اختصاصی و بررسی کاربرد آن برای تشخیص حضور فوزاریوم سولانی در نمونه‌های کراتیتی مشکوک به هرپس سیمپلکس ویروس می‌باشد. حضور این ارگانیسم هم در نمونه‌هایی که با تست PCR از نظر هرپس سیمپلکس ویروس مثبت و هم در نمونه‌هایی که با این تست از نظر HSV منفی بوده‌اند، بررسی شده‌است، تا بتوان احتمال وجود عفونت همراه و نیز احتمال خطای تشخیصی در اثر تشابه نمای بالینی ضایعه را بطور همزمان مورد بررسی و ارزیابی قرارداد.

روش کار

تهیه نمونه: ۱۰۰ نمونه DNA استخراج شده از تراشه زخم‌های قرنیه مشکوک به کراتیت هرپسی متعلق به اورژانس بیمارستان تخصصی چشم پزشکی فارابی جمع آوری گردید. ۳۵ مورد از این نمونه‌های DNA با روش PCR از نظر HSV مثبت، و ۶۵ نمونه دیگر با این روش از نظر ویروس HSV منفی بوده اند. DNA در کلیه این نمونه‌ها با روش DNG استخراج گردیده است.

تهیه سوش استاندارد و استخراج DNA از سوش استاندارد:

ابتدا سوش لیوفلیزه و استاندارد فوزاریوم سولانی متعلق به کلکسیون قارچ‌ها و باکتری‌های صنعتی ایران PTCC NO.5284، در محیط سابرو دکستروز در یک دوره انکوباسیون هفت روزه، ۵۰۰ میکرولیتر از محیط کشت مایع برداشته شد و در دور ۱۰۰۰۰ rpm به مدت ۲ دقیقه سانتریفوژ گردید. مایع رویی دور ریخته شد و رسوب حاصله، در ۱۰۰ میکرولیتر آب دو بار تقطیر استریل به حالت سوسپانسیون درآمد. سپس DNA آن با روش DNG-plus استخراج گردید.

پرایمرهای ویژه PCR و ژن هدف:

فوزاریوم به جز سولانی، شامل گونه‌های اکسیسپروم^۱، پوا^۲، ورتیسولوییدس^۳، گرامیناروم^۴ و پرولیفراتوم^۵ استفاده شد.

انجام تست بر روی DNA استخراج شده از نمونه تراشه‌های قرنیه مشکوک به


هرپس سیمپلکس ویروس: تست بهینه شده پس از بررسی ویژگی و حساسیت بر روی DNA استخراج شده از هر ۱۰۰ نمونه حاصله از تراشه‌های قرنیه مشکوک به هرپس سیمپلکس ویروس انجام گرفت.

یافته‌ها:

محصول PCR بهینه‌سازی شده با DNA استخراج شده از سوش استاندارد، بر روی ژل آگارز ۱/۵ درصد لود شد. اندازه قطعه به دست آمده با استفاده از پرایمرهای ویژه ۳۳۰ bp می‌باشد (شکل ۱A). محصول PCR در پلاسمید pTZ57/R کلون شد. پس از جداسازی تک کلنی‌های سفید، DNA آنها استخراج گردید و به وسیله روش PCR تأیید شد (شکل 1B). حساسیت تست PCR تا یک کپی از DNA فوزاریوم سولانی تعیین گردید. به طوری که تا آخرین تیتراژ رقت تهیه شده (که رقت ۱۰^{-۶} معادل یک کپی از DNA فوزاریوم سولانی بود)، هم‌چنان باند ۳۳۰bp محصول رویت شد (شکل ۲). تست PCR دارای ویژگی صد در صد می‌باشد به نحوی که فقط با DNA فوزاریوم سولانی واکنش داد (شکل ۳). تست بهینه شده با حساسیت و ویژگی ذکر شده، بر روی نمونه‌های DNA استخراج شده، از هر ۱۰۰ نمونه حاصله از تراشه‌های قرنیه مشکوک به هرپس سیمپلکس ویروس انجام گرفت.

شکل 1A

شکل 1B



شکل ۱: الکتروفورز محصول PCR

شکل ۱A: محصول واکنش PCR

- 1- oxysporum
- 2- poa
- 3 - verticillioides
- 4 - graminearum
- 5- proliferatum

دو پرایمر اختصاصی گونه فوزاریوم به نام‌های ffuso1 و rfuso2 برای این منظور در نظر گرفته شد (۵). پرایمر ffuso1 با ترادف 5'-CTC TGT TAA TAA (ترادف 5'-TGC AAC TC-3') و پرایمر rfuso2 با ترادف 5'-TGG TAC TAT AGC TGG AGG A-3' محصول ۳۳۰ bp انتخاب گردید و ژن سیتوکروم بی میتوکندریایی (mt cyt b) به عنوان ژن هدف برگزیده شد.

واکنش PCR:

هر واکنش شامل ۵ میکرولیتر الگو (DNA استخراجی از نمونه)، ۲/۵ میکرولیتر از 10x PCR Buffer، یک میکرولیتر از هر کدام از دو پرایمر جلویی و عقبی 10mM، ۰/۷۵ میکرولیتر از MgCl₂ (50mM)، ۰/۵ میکرولیتر از Taq DNA polymerase، ۰/۴ dNTP 10mM، ۵u/μl در حجم نهایی ۲۵ میکرو لیتر می‌باشد. پروتکل دمایی به صورت دنا تورا سیون اولیه در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد دو دقیقه، دنا تورا سیون سیکل‌ها یک دقیقه در ۹۴ درجه سانتی-گراد، دمای چسبیدن یک دقیقه ۵۰ درجه سانتی‌گراد، دو دقیقه مرحله پلیمریزاسیون در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد، پلیمریزاسیون نهایی ۱۰ دقیقه در ۷۲ درجه سانتی‌گراد و تعداد سیکل‌ها ۳۵ سیکل می‌باشد.

مشاهده محصول PCR:

محصول واکنش در ژل آگارز ۱/۵٪ حاوی سایر گرین (سینا کلون: Cat.No. R7730C) در بافر TBE 0/5 x الکتروفورز گردید.


کلونینگ محصول PCR به عنوان

کنترل مثبت: بعد از خالص‌سازی محصول PCR با استفاده از کیت T/A cloning ترموساینترفیک (cat:K1214) در وکتور pTZ57/R کلون گردید.

تعیین حساسیت و اختصاصی بودن تست

PCR: به منظور بررسی حساسیت تست، رقت‌های مختلف DNA قارچ، از یک میلیون کپی DNA (غلظت ۱۰^{-۱}) تا یک کپی DNA (غلظت ۱۰^{-۶}) تهیه گردید. جهت بررسی ویژگی تست، DNAهای هرپس سیمپلکس ویروس، استرپتوکوکوس پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس و سایر قارچ‌های گونه

در میان ۶۵ نمونه که با روش PCR از نظر ویروس HSV منفی بوده‌اند، ۲ مورد از نظر حضور فوزاریوم سولانی در نمونه مثبت بودند و باند ۳۳۰ bp محصول PCR در این نمونه‌ها رویت گردید (شکل ۴). ولی در ۳۵ نمونه‌ای که با روش PCR از نظر HSV مثبت بودند، باند مربوط به محصول پی سی آر فوزاریوم سولانی رویت نگردید.




شکل ۴: نتایج تست PCR بر روی نمونه‌هایی که از نظر HSV منفی بودند

لای ۱: سایز مارکر ترموساینترفیک 1kb DNA Ladder
لای ۲: DNA فوزاریوم سولانی
لای ۳: نمونه منفی
لای ۴ و ۵: قطعه تکثیر شده ۳۳۰ bp
لای ۶: کنترل منفی

بحث


تعداد کراتیت‌های قارچی با الگوهای اپیدمیولوژیک متفاوت، ظرف چند دهه اخیر رو به افزایش داشته است. منبع این عفونت اگزوزن بیشتر انتقال از طریق تروما و بعضاً استفاده از لنزهای تماسی گزارش شده است. کراتیت ناشی از تلقیح عامل در چشم به علت تروما، اکثراً در میان افراد شاغل در بخش‌های کشاورزی و دامداری به چشم می‌خورد، و از آنجایی که قارچ‌های ساپروفیت و پاتوژن گیاهی نظیر فوزاریوم سولانی در محیط بسیار شایع هستند، برخورد بقایای گیاهی و خاک به چشم منجر به کراتیت قارچی ناشی از این ارگانیسم‌ها می‌شود. از دیگر عوامل زمینه ساز می‌توان به جراحی‌های چشمی، اعتیاد، مصرف قطره‌های آنتی‌بیوتیکی و داروهای کورتیکواستروئیدی در چشم، ورود گرد و غبار و نیز عفونت‌های مخلوط هرپس سیمپلکس ویروس اشاره کرد. به نظر می‌رسد وضعیت سیستم ایمنی و بروز بیماری‌های ویروسی نظیر ایدز، در این رابطه یکی دیگر از عوامل اثرگذار باشد (11,13,17,21). در این خصوص در مطالعه صورت گرفته توسط مسل (Mselle ۱۹۹۹)، فوزاریوم سولانی شایع‌ترین عامل کراتیت قارچی با فراوانی ۷۵٪ گزارش شده است که در این میان ۸۱/۲٪ نمونه‌های کراتیت قارچی متعلق به افراد HIV مثبت بوده است (۱۱). در خصوص عفونت‌های هرپس

لای ۱: سایز مارکر ترموساینترفیک 1Kb DNA Ladder ، لای ۲: قطعه تکثیر شده ۳۳۰ bp
لای ۳: کنترل منفی
شکل 1B: محصول کلون شده :
لای ۱: قطعه تکثیر یافته از پلاسمید،
لای ۲: سایز مارکر ترموساینترفیک 1Kb DNA Ladder ،
لای ۳: قطعه تکثیر شده ۳۳۰ bp ، لای ۴: کنترل منفی



شکل ۲: نتایج بررسی حساسیت تست

لای ۱: سایز مارکر فرمنتاس 1 Kb DNA Ladder
لای ۲: رقت 10^{-1} معادل ۱۰۰۰۰۰ نسخه از DNA فوزاریوم سولانی
لای ۳: رقت 10^{-2} معادل ۱۰۰۰۰ نسخه از DNA فوزاریوم سولانی
لای ۴: رقت 10^{-3} معادل ۱۰۰۰ نسخه از DNA فوزاریوم سولانی
لای ۵: رقت 10^{-4} معادل ۱۰۰ نسخه از DNA فوزاریوم سولانی
لای ۶: رقت 10^{-5} معادل ۱۰ نسخه از DNA فوزاریوم سولانی
لای ۷: رقت 10^{-6} معادل ۱ نسخه از DNA فوزاریوم سولانی



شکل ۳: نتایج بررسی ویژگی تست

لای ۱: سایز مارکر ترموساینترفیک Middel Range DNA Ladder 1113
لای ۲: DNA فوزاریوم سولانی
لای ۳: DNA هرپس سیمپلکس ویروس
لای ۴: DNA استافیلوکوکوس اورئوس
لای ۵: DNA استرپتوکوکوس پنومونیه
لای ۶: DNA فوزاریوم اکسی سپوروم
لای ۷: DNA فوزاریوم پوا
لای ۸: DNA فوزاریوم پرولیفرا توم
لای ۹: DNA فوزاریوم ورتیسلوئیدس
لای ۱۰: DNA فوزاریوم گرامیناروم

سیمپلکس ویروس، نمای بالینی مشابه با کراتیت‌های قارچی از یک سو و نیز گزارش‌های مبنی بر عفونت توام فوزاریوم سولانی و هرپس سیمپلکس ویروس از سوی دیگر، لزوم شناسایی اختصاصی و بررسی احتمال حضور دوگانه این عوامل در کراتیت را مطرح می‌سازد (4,6,8,16). همان‌گونه که ذکر شد، تشخیص تمایزی کراتیت‌های قارچی و ویروسی با تست‌های بهینه شده مولکولی قابل حل می‌باشد.

روش‌های مرسوم نظیر کشت، علاوه بر این‌که زمان‌بر هستند، برای شناسایی عامل در حد گونه به نسبت دشوار بوده و نیاز به تخصص بسیار دارند. در همین رابطه تجربه نشان داده است بین ۳۳ تا ۵۰ درصد موارد عفونتی که فوزاریوم گزارش شده‌اند، دچار خطای تشخیصی بوده‌اند (14,17). شناسایی عامل در حد گونه برای تجویز دارو امری تعیین کننده است. زیرا پاسخ دارویی گونه‌های مختلف متفاوت می‌باشد. برای مثال گونه‌های فوزاریوم سولانی و فوزاریوم ورتیسولوییدس معمولاً به آزول‌ها مقاوم بوده و MIC آن‌ها برای آمفوتریسین بی، بیشتر از سایر گونه‌ها می‌باشد. حال آنکه گونه‌های اکسی سپروم و مونیلیفورم تا حدودی به وریکونازول و پوزاکونازول حساس هستند (۱۷،۷). از آنجایی که گونه‌های جنس فوزاریوم یک مقاومت کلی و نسبی به تمامی عوامل ضد قارچی از خود نشان می‌دهند، بسیار مناسب خواهد بود که بتوان حضور آن‌ها را در ابتدا و پیش از تکثیر ارگانیسم در نمونه تشخیص داد. حساسیت تست به کار رفته در این مطالعه در حد یک نسخه از DNA فوزاریوم سولانی است که برای تشخیص زودهنگام ارگانیسم بسیار مؤثر می‌باشد. به علاوه حضور ارگانیسم‌های همراه نظیر عفونت‌های مخلوط ویروسی و قارچی با مشاهده مستقیم میکروسکوپی و یا سایر روش‌های مرسوم نظیر کشت قابل پیگیری نخواهد بود، اما تکنیک‌های مولکولی قادرند این موانع را برطرف نمایند. تکنیک PCR و مشتقات آن به علت مزایایی که به نسبت سایر روش‌ها دارند، در اغلب مطالعات ارجحیت تشخیصی داشته‌اند. گودی (Godoy) در سال ۲۰۰۴ با روش‌های PCR-RFLP و ERIC-PCR ۴۴۰ ایزوله فوزاریوم سولانی را به عنوان اصلی‌ترین عامل کراتیت در برزیل شناسایی و گزارش نمود (۷).

با وجود ارزشمندی این تحقیقات، امادر مجموع روش‌هایی نظیر RFLP علاوه بر آنکه طولانی و نسبتاً پیچیده می‌باشند، برای تشخیص نیاز به کشت‌های خالص عوامل قارچی دارند، در صورتی که با روش‌های PCR محض می‌توان ارگانیسم را به‌طور مستقیم در نمونه‌ها شناسایی کرد.

اچسler (Oechsler) نیز در سال ۲۰۰۹ با روش PCR و استفاده از توالی‌های ITS بر روی نمونه‌های کراتیتی، اقدام به شناسایی گونه‌های مختلف فوزاریوم در این موارد نموده‌اند. در این روش ارگانیسم‌های عامل در نمونه‌های کراتیتی با کمک توالی ITS در حد جنس و گونه مورد شناسایی قرار گرفته‌اند (۱۴). در برخی دیگر از مقالات نیز از توالی‌های ITS و β -TUB (۱۷،۱۴) برای شناسایی مولکولی فوزاریوم و سایر قارچ‌ها استفاده شده است. این توالی‌ها اگر چه در خصوص شناسایی سایر گونه‌های فوزاریوم دارای مزیت‌هایی می‌باشند اما توصیه شده است که در خصوص گونه سولانی بهتر است از کاربرد توالی‌های ITS و β -Tubulin اجتناب کرد زیرا آلل‌های مضاعف متغیر یا پارالوگ در نتایج تست امکان خطا را افزایش می‌دهد (15,17). ژن هدف mt-cty-b و پرایمرهای به کار رفته در این مطالعه برای شناسایی گونه فوزاریوم سولانی بسیار اختصاصی می‌باشد.

دان هی (Dan HE) با کاربرد این ژن هدف و پرایمرهای ffuso1 و rfuso2 در میان ۱۶۰ بیمار مبتلا به کراتیت توانسته است فوزاریوم سولانی را به عنوان شایع‌ترین عامل کراتیت قارچی در این نمونه‌ها شناسایی نماید. میزان ویژگی تست آن‌ها نشان داد که روش به کار رفته، برای شناسایی اختصاصی گونه فوزاریوم سولانی بسیار مناسب می‌باشد (۵). با آن که در مطالعه حاضر در میان ۳۵ نمونه مثبت از نظر هرپس سیمپلکس ویروس هیچ مورد مثبتی از فوزاریوم سولانی مشاهده نگردید، اما نمی‌توان حضور توام فوزاریوم سولانی را در کراتیت‌های هرپسی به عنوان عفونت همراه کاملاً منتفی دانست. به نظر می‌رسد در این خصوص باید تعداد موارد بیشتری را بررسی نمود. در این مطالعه با بهینه‌سازی شرایط واکنش، میزان حساسیت تست و اختصاصی بودن آن به حداکثر سطح ممکن ارتقا یافته است. در نتیجه این امکان وجود دارد که بتوان حضور ارگانیسم را در اولین مراحل، قبل از تکثیر ارگانیسم و پیشروی عفونت در نمونه تشخیص داد. طبعاً تشخیص سریع و دقیق در درمان و پیشگیری از پیامدهای جبران ناپذیر آن تأثیری به سزا دارد. در این مطالعه با توجه به نتایج تست PCR می‌توان چنین نتیجه گرفت که برخی از کراتیت‌های مشکوک به هرپس سیمپلکس ویروس در واقع ناشی از فوزاریوم سولانی است که بعلت تشابه نمای بالینی در ابتدا جزء موارد ویروسی قلمداد شده‌اند. در این

مطالعه هیچ موردی از عفونت توأم قارچی و ویروسی رویت نگردید.

نتیجه‌گیری:

در مطالعه حاضر ۱۰۰ نمونه مشکوک به کراتیت هرپسی از لحاظ حضور فوزاریوم سولانی مورد بررسی قرار گرفتند. در میان آن‌ها ۳۵ نمونه DNA حاصل از تراشه‌های قرنیه با روش PCR از نظر HSV مثبت بودند، که با انجام تست پی سی آر اختصاصی و بهینه‌سازی شده فوزاریوم سولانی بر روی این نمونه‌ها هیچ گونه باند مربوط به محصول پی سی آر فوزاریوم سولانی در این ۳۵ مورد رویت نگردید. با توجه به این که حساسیت تست در حد یک نسخه از DNA فوزاریوم سولانی در نمونه‌ها می باشد، حتی حضور یک ارگانسم فوزاریوم سولانی به صورت همراه در این نمونه‌ها منتفی می‌باشد. بخش دیگر کار مربوط به ۶۵ نمونه DNA استخراج شده از تراشه‌های کراتیتی مشکوک به هرپس سیمپلکس ویروس بود، که این نمونه‌ها از نظر وجود این ویروس با انجام تست PCR منفی، گزارش و تأیید شده بودند. با انجام تست PCR اختصاصی گونه فوزاریوم

منابع

۱. فتی سارا و همکاران. کراتیت‌های قارچی، عوامل، زمینه‌های مستعدکننده و نتایج پاسخ به درمان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. بهار ۸۹. شماره ۱. صفحه ۱۶-۲۵
۲. نوروزپور دیلمی کیومرث، شکوهی طاهره، هدایتی محمد تقی، معدل حقیقی ته‌مین، خلیلیان علیرضا. شیوع کراتیت قارچی در مراجعه کنندگان با زخم قرنیه به بیمارستان بوعلی سینای ساری در سال ۱۳۸۳. مجله چشم پزشکی بینا. زمستان ۱۳۸۴. دوره ۱۱. شماره ۲. صفحه ۱۹۱-۱۹۸

3. Alfonso EC., et al., Insurgence of Fusarium keratitis associated with contact lens wear. Arch Ophthalmol, 2006.124(7):941-947.
4. Akshaya.R, Amrutha.P” A Study on the Epidemiological and Microbiological Aspects of Keratomycosis, Hyderabad, South India. The journal of young investigators. 2010. 20 (1):2-7.
5. Dan He, Jilong Hao, Bo Zhang, Yanqiu Yang, Wengang Song, Yunfeng Zhang, Koji Yokoyama and Li Wang” Pathogenic Spectrum of Fungal Keratitis and Specific Identification of Fusarium solani” iovs. 2011. 52 (5): 2804-2808.
6. Dóczi, T. Gyetvai, L. Kredics, E. Nagy, Involvement of Fusarium spp. in fungal keratitis. Clinical Microbiology and Infection. 2004. 10(9): 773-776.
7. Godoy, P., J. Cano, J. Gene, J. Guarro, A.L. Hofling-Lima and A.L. Colombo., Genotyping of 44 isolates of Fusarium solani, the main agent of fungal keratitis in Brazil. J. Clin. Microbiol. 2004. 42: 4494-4497.
8. Gupta V, Dada T, Vajpayee RB, Sharma N, Dada VK. Polymicrobial keratitis after laser in situ keratomileusis. J Refract Surg. 2001; 17: 147-148.
9. Mancini N. et al. Rapid molecular identification of fungal pathogens in corneal samples from suspected keratomycosis cases. J Med Microbiol. 2006 Nov; 55(Pt 11):1505-9

10. Mohammad Arif, Shilpi Chawla, N. W. Zaidi, J. K. Rayar M. Variar and U. S. Singh. Development of specific primers for genus *Fusarium* and *F. solani* using rDNA sub-unit and transcription elongation factor (TEF-1 α) gene. *African Journal of Biotechnology*. 2012. 11(2): 444-447.
11. Mselle J. Fungal keratitis as an indicator of HIV infection in Africa. *Trop Doct*. 1999. 29(3):133-5.
12. Nelson PE, Dignani MC, Anaissie EJ. Taxonomy, biology, and clinical aspects of *Fusarium* species. *Clin Microbiol Rev*. 1994. 7(4):479-504.
13. Nucci, M. and E. Anaissie. *Fusarium* infections in immunocompromised patients. *Clin. Microbiol. Rev*. 2007. 20: 695-704.
14. Oechsler A, Rafael et al. Utility of molecular sequence analysis of the ITS r RNA region for identification of *Fusarium* spp. From ocular sources. *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci*. 2009. 50 (5): 2230-2236.
15. O'Donnell Kerry, et al. Internet-Accessible DNA Sequence Database for Identifying *Fusaria* from Human and Animal Infections. *J. Clin. Microbiol*. 2010. 48(10):3708-3718.
16. O'Donnell, K., et al. Phylogenetic diversity and microsphere array-based genotyping of human pathogenic *Fusaria*, including isolates from the multistate contact lens-associated U.S. keratitis outbreaks of 2005 and 2006. *J. Clin. Microbiol*. 2007. 45: 2235-2248.
17. P.K. Jain, V.K. Gupta, A.K. Misra, R. Gaur, V. Bajpai and S. Issar. Current Status of *Fusarium* Infection in Human and Animal. *Asian Journal of Animal and Veterinary Advances*. 2011. 6: 201-227.
18. Ritterband DC, Seedor JA, Shah MK, Koplin RS, McCormick SA. Fungal keratitis at the New York Eye and Ear Infirmary. *Cornea*. 2006. 25(3):264-267.
19. Suhail Ahmad, Zia U. Khan, Ajmal M. Theyyathel. Development of a nested PCR assay for the detection of *Fusarium solani* DNA and its evaluation in the diagnosis of invasive fusariosis using an experimental mouse model. *Mycoses*. 2010. 53(1):40-47.
20. Wang He, et al. Accurate and practical identification of 20 *Fusarium* species by seven -locus sequence analysis and reverse line blot hybridization, and an invitro antifungal susceptibility study. *Journal of clinical microbiology*. 2012. 49 (5): 1890-1898.
21. Zhang, N., K. O'Donnell, D.A. Sutton, F.A. Nalim, R.C. Summerbell, A.A. Padhye and D.M. Geiser. Members of the *Fusarium solani* species complex that cause infections in both humans and plants are common in the environment. *J. Clin. Microbiol.*, 2006. 44: 2186-2190.