

نقش‌های پروتئین هسته‌ای HMGB1 و دمین‌های اصلی آن در زمینه‌های مختلف بیولوژی

سمیه طالبی^۱، اعظم بوالحسنی^{۲*}، طلعت مختاری آزاد^۳، آرش آرش کیا^۴، محمد حسین مدرسی^۵

۱. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
۲. بخش هپاتیت و ایدز، انتیتوپاستور ایران، تهران، ایران
۳. گروه ویروس شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
۴. بخش ویروس شناسی، انتیتوپاستور ایران، تهران، ایران
۵. گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده:

پروتئین داخل سلولی (High mobility group box 1) HMGB1، پروتئین داخل سلولی است که به هسته انتقال می‌یابد و بیان ژن‌ها را تنظیم می‌کند. پروتئین HMGB1 به عنوان یک پروتئین چند عملکردی نقش خود را از طریق نوترکیبی، تنظیم رونویسی و التهاب ایفا می‌کند. پروتئین HMGB1 به کیناز وابسته به سایکلین مانند CDK2 متصل می‌شود که رونویسی ژن‌های مرتبط با پیشرفت چرخه سلولی را کنترل می‌کند. به علاوه HMGB1 به عنوان سایتوکاین جدید نقش مهمی در التهاب و بیماری‌هایی نظری آرتیت دارد. به تازگی، نقش پروتئین HMGB1 به عنوان ادجوانت (یاور) و محرك هر دو پاسخ ایمنی سلولی و همورال (سرمی) در عفونت‌های ویروسی نظری HIV-1 و آنفلوآنزا به اثبات رسیده است. برخی مطالعه‌ها نشان دادند که Hp91. Hپتید مشتق شده از پروتئین HMGB1، به عنوان محرك مؤثر و قوی برای بلوغ دندرتیک سل (DC) عمل کرده و توانسته است پاسخ‌های ایمنی سلولی و همورال را تحت شرایط درون تنی تقویت کند. یافته‌های اخیر ما نیز نشان داد که پتید 91 و طول کامل ژن HMGB1 توانسته‌اند به عنوان ادجوانات مؤثر به منظور بهبود کارآیی واکسن‌های درمانی پروتئینی و DNA بی در مقابل عفونت ویروس پاپیلومای انسانی به ترتیب عمل کنند. در این مطالعه، خلاصه‌ای از ساختار و عملکردهای HMGB1 در بیولوژی مولکولی و پزشکی شرح داده می‌شود.

واژه‌های کلیدی : ادجوانات اندوژنوس، Hp91، HMGB1، فعالیت بیولوژیکی

(۶۳، ۶۲، ۷۳، ۸۸). انواع ادجوانات‌های اندوژنوس شامل پروتئین‌های

شوك حرارتی، ترکیب‌های باکتریایی (توکسین، لیپوپلیساکارید، پتیدوگلیکان)، ادجوانات‌های براساس اسید سیتوپلاسم، میتوکندری، هسته سلول وجود دارند و به عنوان چاپرون برای پروتئین‌ها فعالیت می‌کنند. عملکرد آن‌ها به عنوان چاپرون چاپرون مولکولی در فرایندهای متنوع مانند تاخوردگی پروتئین‌ها، سرهمندی و انتقال، پردازش آنتی-ژن تحت شرایط استرس و فیزیولوژیکی می‌باشد. از مهم‌ترین اسید HSPs Gp96 و Gp70 اندوژنوس (۳۶، ۷۲).

بروتئین HMG یا بروتئین‌های دارای حرکت الکتروفورزی بالا روی ژل SDS-PAGE به سه زیر خانواده براساس دمین‌های عملکردی انتهایی N تقسیم می‌شوند به نام‌های (HMGA، HMGB، HMGN) که همه دارای ظرفیت اتصال و خم

مقدمه

به معنی کمک یا یاور adjuvant از کلمه لاتین ke قادر به افزایش یا تعدیل پاسخ‌های ایمنی منشأ گرفته است همورال یا سلولی در مقابل آنتی ژن مورد نظر می‌باشد (۷۴). برخی ادجوانات‌های استفاده شده با کارآیی بالا از اجزای میکروارگانیسم‌ها نظری لیپوپلیساکاریدها به دست آمده‌اند. بررسی‌ها نشان داده‌اند که در سیتوپلاسم سلولی، ادجوانات‌های اندوژنوس وجود دارند که منجر به تقویت پاسخ لنفوسيت در برابر آنتی ژن‌های خاص می‌شوند. (CTL) سایتو توکسیک این ادجوانات‌ها در زمان آسیب سلولی یا نکروز، آزاد می‌شوند

نویسنده مسئول : بخش هپاتیت و ایدز، انتیتوپاستور ایران، تهران، ایران

پست الکترونیکی: azam.bolhassani@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۸

علیه پاتوزن مورد نیاز است (۱۶، ۱۷). به علاوه، این پروتئین به دلیل نقش های مختلف در نوترکیبی، تنظیم رونویسی و التهاب، اهمیت زیادی در جنبه های ایمونولوژی و پزشکی نظری سلطان و واکسن پیدا کرده است (۸۶، ۲۵). هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش های مختلف HMGB1 در زمینه های مختلف بیولوژی و پزشکی می باشد.

تکیکها و روش های مختلف به منظور تعیین ساختار و اثرهای بیولوژیکی و ایمنولوژیکی HMGB1 توسط گروه های مختلف استفاده شده اند. به عنوان مثال، تنسیفکشن (تراگیرش) HEK-293T و رده های مختلف سلولی پستانداران از قبیل COS-7 با ساختارهای DNA^۳ به HMGB1 می باشد. HMGB1 با استفاده از معرف های تنسیفکشن پلیمری نظیر توربوفکت و پلی اتیلن ایمین توسط گروه ما انجام شد و بیان آن توسط آنالیز فلوسایتومتری و وسترن بلات تحت شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد (۷۹). به علاوه، خواص تحریک پاسخ ایمنی آن در واکسیناسیون های بر اساس پروتئین و DNA در مدل موشی ارزیابی شدند (۸۱).

DAMPs^۴ (الگوی مولکولی وابسته به خطر)

مولکول های زیستی میزبان هستند که می توانند باعث شروع و تداوم یک پاسخ التهابی غیر عفونی شوند. در مقابل، الگوی مولکولی وابسته به پاتوزن (PAMPs)^۴ باعث شروع و تداوم پاسخ التهابی تحریک شده توسط پاتوزن عفونی می شوند (۸۲). زیر مجموعه ای از DAMPs^۴ پروتئین هسته ای یا سیتوزولی هستند. زمانی که آن ها در پی آسیب بافتی به خارج از سلول رها می شوند یا در معرض سطح سلول قرار می گیرند، به دلیل تغییر شرایط محیطی، تجزیه می شوند (۴۷).

انواع DAMP ها

DAMP^۴ ها بسیار وابسته به انواع سلول (اپی تلیال یا مزانشیمی) و بافت زخمی هستند. پروتئین های DAMP شامل پروتئین های داخل سلولی مانند پروتئین های شوک حرارتی، HMGB1 و پروتئین های مشتق از ماتریکس خارج سلولی هستند که در پی آسیب به بافت مانند قطعه های هیالورونان تولید می شوند. نمونه هایی از DAMPs^۴ های غیر پروتئینی شامل ATP، اسید اوریک، هپارین سولفات و DNA هستند (۳۷).

کردن DNA هستند اما به خودی خود فاکتورهای رونویسی نیستند (۹۸). پروتئین HMGA عضوی از خانواده پروتئین HMG است که در فرآیندهای هسته ای و نیز به عنوان فاکتور رونویسی نقش دارد و بیان ژن های متعدد تحت شرایط درون تنی را تنظیم می کند (۳۱، ۲۴، ۹۷). پروتئین HMGN به نوکلئوزوم ها بدون هیچ اختصاصیتی برای توالی DNA متصل می شود و در همه سلول های مهره داران بیان می شوند (۸۵). پروتئین HMGB1 و پروتئین های شوک حرارتی اولین پروتئین های شناخته شده از الگوی مولکولی مرتبط با خطر (DAMP) می باشند (۷۶). گزارش ها نشان دادند که DAMPs^۴ ها شامل پروتئین های شوک حرارتی، سایتوکاین و پروتئین HMGB1 می باشند (۳). در مطالعه ای توسط HSP^۴ ها Bolhassani و همکاران نشان داده شد که ادجوانی در گسترش واکسن های پیشگیری کننده و درمانی دارند (۹). در مطالعه دیگری توسط این محققان از استراتژی های مختلف برای افزایش کارایی DNA واکسن با استفاده از ادجوانی پروتئین شوک حرارتی مثل GP96 با سیستم های انتقالی مختلف فیزیکی استفاده شد و نتایج حاکی از افزایش پاسخ های ایمنی طولانی مدت تحت شرایط درون تنی بود (۱۱، ۸). به علاوه، با بررسی وجود آنتی بادی بر علیه HPV16 E7 و GP96 در بیماران مبتلا به سرطان سرویکس، به این نتیجه رسیدند که فعالیت سرولوژیکی بر علیه سه پروتئین نوترکیب (rCT-gp96 و rNT-gp96، rE7) به طور معنی داری در بیماران دارای کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) نسبت به گروه کنترل سطوح بالایی را نشان داد (۱۰).

در سال ۱۹۷۳ Goodwin^۱ یافت که پروتئین های غیر هیستونی هسته ای توسط حرکت زیاد شان در ژل الکتروفورز پلی آکریل امید مشخص می شوند که ویژگی سوپر خانواده HMG است و آن ها را گروه پروتئین های بسیار متحرك نامید. این پروتئین بیش از ۳۰ سال پیش، اولین بار در تیموس گوساله به عنوان پروتئین هسته ای که دارای دومین منحصر به فرد متصل شونده به DNA است کشف شد (۲۶). نام دیگر آمفوترین می باشد که از نظر تکاملی بسیار حفاظت شده است و در انواع سلول ها حتی در بسیاری از انگل ها بیان می شود (۵۴). پروتئین HMGB1 انسانی توسط ژن HMGB1 کد شده است و دارای ۱۴ اینtron 2 (12 gt-ag, 12 gc-ag) و ۱۵ اگزون است (۱۰، ۴۹). پروتئین HMGB1 به عنوان مولکول DAMPs^۴ برای پاسخ های اکتسابی مؤثر بر

¹ In vivo

² Damage-associated molecular patterns

³ Damage-associated molecular patterns

⁴ Pathogen-associated molecular patterns

مونوسیت‌ها، ماکروفاژها و سلول‌های دندریتیک را تحریک می‌کند. این پروتئین به عنوان ادجوانت برای به تأخیر انداختن رشد تومور فعالیت می‌کند (۳۲،۲۲). در سیتوپلاسم، HMGB1 به پروتئین beclin1 متصل می‌شود، اتوفاژی را افزایش می‌دهد، آپوپتوز را مهار می‌کند و مورفولوژی میتوکندری و فعالیتش را تنظیم می‌کند (۹۴،۵). در اصل HMGB1 می‌تواند آدنوزین تری فسفات و دیگر مولکول‌های التهابی را از سلول‌های نکروتیک آزاد کند اما نمی‌تواند از سلول‌های آپوپتوز شده آزاد کند (۴۲). در مطالعه Talebi و همکاران، با بررسی بیان ژن E7 ویروس پاپیلومای انسانی نوع ۱۶ کوژنوجه شده با HMGB1 تحت شرایط آزمایشگاهی در سلول‌های پستانداران به این نتیجه رسیدند که پروتئین فیوژن می‌تواند به طور مؤثر در سلول‌های پستانداران برای استفاده در ایمونوتراپی بیان شود (۷۹). شکل ۲، برخی از فعالیت‌های بیولوژیکی HMGB1 را نشان می‌دهد.

Treg‌ها: تعدادی از آزمایش‌ها پیشنهاد کردند HMGB1 که HMGB1 آزاد شده از سلول تومور ممکن است سلول T CD8⁺ مرتبط با اینمنی ضد تومور را با ازدیاد سلول‌های تنظیمی (Tregs) مهار کند که منجر به تولید اینترلوکین ۱۰ (IL-10) می‌شوند (۳۹).

DC‌ها: به تازگی بررسی‌ها نشان دادند که عملکرد DC‌ها شامل توانایی آن‌ها برای فعال کردن سلول‌های CD4+T است که نیازمند رهاسازی اتوکراین/پاراکرین پروتئین هسته‌ای HMGB1 می‌باشد. پروتئین HMGB1 به عنوان فعال کننده DC‌ها عمل می‌کند و ممکن است پاسخ‌های التهابی را با واسطه DC توسط افزایش بیان TLR4 و فعالیت دوباره آن و دیگر مولکول‌های DAMP یا الگوی مولکولی وابسته به خطر هدایت کند (۱۴). بررسی‌ها نشان دادند که HMGB1، رهاسازی اینترفرون گاما از ماکروفاژ (اما نه از سلول دندریتیک) افزایش می‌دهد. این تنها هنگامی مؤثر است که با دیگر سیتوکین‌های پیش التهابی بهخصوص با IL-2 و در ترکیب با IL-1 و یا IL-12 باشد (۵۳). HMGB1 و ماکروفاژها: HMGB1 فاگوسیتیز را از طریق اتصال به فسفاتیدیل سرین (PS) در معرض قرار گرفته در سطح نوتوفیل‌های آپوپتوز شده کاهش می‌دهد. در مونوسیت/ماکروفاژهای سلول‌های انسانی، HMGB1 محرك قوی رهاسازی چندین سایتوکاین پیش التهابی شامل TNF-α، IL-1α, IL-1β, IL-1ra, IL-6, IL-8, MIP-1α, MIP-1β اما نه IL-10 و IL-12 است (۴۳).

ساختار HMGB1

خانواده HMGB شامل سه عضو HMGB2، HMGB1 و HMGB3 با یک تشابه آمینواسیدی ۸۰٪ در میان سه پروتئین می‌باشد. پروتئین HMGB1 یک پروتئین هسته‌ای ۳ کیلودالتونی است که از بافت مغز جداسازی شده است و شامل ۲۱۵ آمینو اسید می‌باشد. این پروتئین شامل دو دمین اتصال به DNA می‌باشد: A box و B box (鞠部 A و B) هر کدام دارای طول ۷۵ آمینواسید می‌باشند) و یک انتهای C ترمینال با بار منفی دارای زیر واحدهای پیوسته گلوتامات و آسپارتات است. ناحیه A box (۸۹-۱۰۸) به عنوان یک آنتاگونیست ویژه عمل می‌کند در صورتی که فعالیت سایتوکاین HMGB1 توسط B box (۹۰-۱۷۶) تعیین می‌شود (۹۱،۵۲،۱۱۳). در مقابل، HMGB مخمر (Nhp6-a) و (b) تنها یک دمین HMG دارد و بدون دم اسیدی است. پروتئین HMG می‌تواند به شکل صلیب، تک رشته یا دو رشته با تمایل بالا از طریق جعبه HMG و انتهای C اسیدی متصل شود. ارتباط بین DNA و HMG با واسطه زیر واحدهای آمینواسیدی بازی پروتئین است. مطالعه‌های ساختاری با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی HMG هسته‌ای ثابت می‌کند که دمین اتصال به DNA در دارای ساختار L شکل ساخته شده از سه مارپیچ است که سطوحی برای تداخل‌های با DNA و پروتئین فراهم می‌کند (۷۵،۳۳). شکل ۱، ساختار HMGB1 را نشان می‌دهد.

نقش‌های HMGB1

ایمونولوژی

در شرایط *in vivo* HMGB1 پاسخ‌های آنتی‌بادی اولیه در برابر آنتی‌ژن‌های محلول را افزایش می‌دهد. سلول‌های آسیب دیده و نکروز شده HMGB1 را رها می‌کنند (۹۹). این پروتئین خارج سلولی فاقد سیگنال پیتید ترشحی است و به سیستم گلزی / شبکه اندوبلاسمی نمی‌تواند مهاجرت کند. در یک بررسی نشان داده شد که فعال سازی مونوسیت‌ها منجر به تجمع HMGB1 در وزیکول‌های سیتوپلاسمی می‌شود (۳۳). پروتئین HMGB1 به طور فعالانه به محیط خارج سلولی ترشح می‌شود و به عنوان سایتوکاین، کموکاین و فاکتورهای رشدی که مهاجرت سلولی و التهاب را تقویت می‌کند، ایفای نقش می‌کند. زمانی که HMGB1 از سلول رها می‌شود به عنوان سیگنال خطر درونی، رهاسازی سایتوکاین از

را خم می کند و اتصال دیگر پروتئین ها را تسهیل می کند. ارتباط آن با هیستون های مرکزی، ساختار نوکلئوزوم را تغییر می دهد به صورتی که DNA بسته بندی شده را سست کند و منجر به بازسازی کروماتین شود. در موجودات عالی، HMGB1 در هسته سلول بیان می شود و به عنوان DNA چاپرون عمل می کند که چندین فرایند سلولی نظیر رونویسی، همانندسازی، نوترکیبی، ترمیم DNA و پایداری ژنوم را تحت تأثیر قرار می دهد (۹۳،۵۸،۳۵). نقش HMGB1 در ترمیم DNA توسط مکانیزم های مختلفی مانند ترمیم از نوع mismatch برداشت نوکلئوتید (NER) و ترمیم عدم تطابق (repair) است (۶۵). بررسی ها نشان دادند که HMGB1 نوترکیب اتصال p53 به DNA را تحت شرایط آزمایشگاهی افزایش می دهد. پروتئین HMGB1 ساختار DNA مناسب را برای اتصال به p53 از طریق خم کردن مولکول DNA فراهم می کند. به علاوه، HMGB1 فعالیت RB را سرکوب می کند و رونویسی هر دوی E2F و cyclin-A را افزایش می دهد (۶۸). این پروتئین به طور ویژه با اعضای خانواده REL از فاکتورهای رونویسی واکنش می دهد. پروتوآنکوژن Rel-c، پروتئینی است که در انسان توسط ژن REL کد می شود و عضوی از خانواده NF-κB می باشد (۸۷). محققان نشان دادند که در درمان سرطان با cisplatin HMGB1 کارایی ضد سرطان دهد. مطالعه های اخیر نشان داد که حضور HMGB1 در هسته وابسته به تغییرهای پس از ترجمه است. زمانی که پروتئین غیر استیله است، در هسته باقی می ماند، اما هایپر استیلاسیون واحد های لیزین منجر به انتقال آن به سیتوزول می شود (۱،۳۴).

نقش های بیماری زایی یا پاتوژنیک

شواهدی وجود دارد که از نقش بیماری زایی برای HMGB1 خارج سلولی در التهاب ناشی از عفونت یا آسیب حمایت می کند. برای مثال، HMGB1 دخیل در بیماری های مختلف مثل سپسیس، ایسکمی، آرتریت، منیتیت و سرطان است (۹۹،۳۳،۲۸). برخی مطالعه های حیوانی نشان دادند که مایکو باکتریوم توبرکلوزیس می تواند به طور مؤثر ترشح HMGB1 را تحریک کند و منجر به فعال کردن بیش از حد سایتوکاین و آسیب بافت ریه شود. به تازگی، افزایش HMGB1 در سرم بیماران آلوده شده با مایکو باکتریوم توبرکلوزیس گزارش شده اما اهمیت آن نامشخص است. در بیماران با سل ریوی پیشرفته، سایتوکاین های پیش التهابی و سیگنالینگ

گیرنده های HMGB1 و ارتباط با آن ها: چندین رسپتور در عملکرد HMGB1 نظیر رسپتورهای TLR2، RAGE، TLR9، TLR4 و CD24/Siglec-10 نقش دارند. گیرنده RAGE است که از عصاره اندوتیال گاو به عنوان گیرنده AGE، تخلیص می شود. عضوی از ژن های RAGE وابسته به تهاجم، گیرنده سطح سلولی، متعلق به خانواده ایمونوگلوبولین است. گزارش های متعددی بر ارتباط بین بیان RAGE و سرطان منتشر شده است. RAGE بسیار وابسته به رشد سلولی، تهاجم سلولی از طریق فعال سازی MAPK و بیان MMP-9 در سلول های گلیوما است. بیان بالای RAGE در سرطان های کولون و دهان در جوندگان مشاهده شده است (۱۶). پروتئین های HMGB1 و HMGB2 با گیرنده های هورمون استرئوئیدی هسته ای شامل رسپتورهای استروژن، آندروژن و گلوكورتیکوئید تسهیل کننده اتصال به DNA هدفشان، واکنش می دهد. پروتئین HMGB1- چنین با توپوایزومراز ۲ آلفا واکنش می دهد که در تومورها بسیار بیان می شود و درگیر در تکثیر و تفکیک کروموزوم و نوترکیبی هست و فعالیت کاتالیتیکی آن را تحریک می کند (۵۰). این پروتئین با TLR4 از طریق پیوند دی سولفیدی در موقعیت C23 و C106 و C45 و فاقد تیول ارتباط برقرار می کند. این پروتئین می تواند با لیگاند TLR4 واکنش دهد و نیز سایتوکاین ها و سلول ها را از طریق گیرنده های سلولی چندتایی که شامل TLR4، TLR2 و RAGE است، فعال TLR4 کند (۱۹، ۷۰). پروتئین HMGB1 خارج سلولی به ۸۸ متصل می شود و باعث پاسخ اولیه تمایز میلوبئیدی ژن MyD88 می شود تا فاکتور هسته ای تقویت کننده زنجیر سیک کاپای سلول های B (NF-κB) را فعال کند. فاکتور NF-κB فعال شده از سیتوپلاسم به هسته منتقل می شود و بیان فاکتور التهابی، تمایز سلولی را تحریک می کند. بنابراین نقش مهمی در پیدایش تومور و پیشرفت آن ایفا می کند. بنابراین HMGB1 نقش مهمی در بیماری های خودایمنی و سرطان ایفا می کند و TLR4، HMGB1 و NF-κB همگی در پیشرفت تومور و متاستاز و بد خیمی تومور شرکت می کنند، اگرچه اثرهای این واسطه ها در آسیب های پیش سرطانی، کارسینوم سلول های سنگفرشی به طور کامل روشن نشده است (۴۴، ۱۷).

ارتباط با ژنوم

پروتئین هسته ای HMGB1 DNA را سازمان دهی می کند و رونویسی را تنظیم می کند. بعد از اتصال، HMGB1

برون تنی مهار می‌کند. این پروتئین ترشح VEGF (فاکتور رشد اندوتیال عروقی) را در سلول‌های سرطان دهان انسان تحريك می‌کند اما نمی‌تواند VEGF-C را تحريك کند. فاکتورهای VEGF-C و VEGF-D وابسته به متاستاز غده لنفاوی است. القای تمایز VEGF از VEGF-C از طریق فعال سازی رسپتور RAGE توسط HMGB1 ممکن است دلیل آن باشد که بیان RAGE وابسته به آنزیوژن لغفی نیست. مسیر سیگنالینگ داخل سلولی RAGE، بیان VEGF را از طریق فعال سازی NFKB، فعال کننده پروتئین 1 (AP-1) و فاکتور القایی هایپوكسیا 1 α (HIF) فعال می‌کند (۱۰۵،۳۰).

نقش در سرطان

پروتئین HMGB1، پروتئین چند کاره است و دارای فعالیت بیولوژیک متنوع در سلول‌های طبیعی است. نقش HMGB1 در سرطان متنوع است. به طور اصول HMGB1، به عنوان لیز کننده سلولی (۳۰ KDa) متاستاز سلول‌های سرطانی را تسريع می‌کند. این پروتئین در ارتباط با افزایش فعالیت‌های فاکتورهای رونویسی دخیل در توسعه سرطان، شامل p53، p73، پروتئین رتینوبلاستوما، اعضای Rel/NF-κB و گیرنده‌های هورمون هسته‌ای مثل گیرنده استروژن است. درمان ضد سرطان مانند رادیوتراپی و شیمی درمانی باعث مرگ سلول و تقویت آزاد سازی فعال HMGB1 است. لوکوسیت‌های فعال شده به طور فعال HMGB1 را ترشح می‌کند. پروتئین HMGB1 خارج سلولی واسطه در فعالیت‌های مهم، شامل تحريك کردن رهاسازی فاکتور TNF-آلفا و اینترلوکین بتا و دیگر محصول‌های التهابی، فعال کردن سلول‌های اندوتیال، فعال سازی ایمنی ذاتی است و هم‌چنین بلوغ سلول دندریتیک که در زمینه سرطان منجر به پاسخ‌های التهابی مزمن می‌شود. HMGB1 مسیرهای سیگنالینگ در گیر در پروتئین کیناز B (AKT)، پروتئین کیناز فعال کننده میتوژن (MAPKs) و NF-κB را فعال می‌کند که نقش مهمی در رشد توموری دارد. بیان بالای Hsp72 به طور مؤثری HMGB1 را مهار می‌کند که القا کننده بیان سایتوکاین TNF-آلفا و اینترلوکین ۱ بتا است و مهار مسیر NF-κB HMGB1 قوی است (۱۰۷،۷۸،۲۰). پروتئین Hsp72 با اغلب نه تنها در سلول‌های سرطانی مانند کارسینوماتی سینه، واژن، دستگاه گوارشی، سر و گردن، نازوفارنکس و لنفوکارسینوماتی می‌شود بلکه در سلول‌های اندوتیال فعال شده که در داخل بافت‌های سرطانی یافت می‌شود، بیان می‌شود. سلول‌های سرطانی معده و کلون، بیان هم‌زمان مربوط به

HMGB1/RAGE تظاهرات بیماری ایفا می‌کند (۶). تنظیم بالای HMGB1 در طی فیبروز کبد ممکن است دخیل در بازسازی بافت و فیبروژن از طریق فعال سازی سلول‌های ستاره‌ای کبد (HSCs) شود. شواهد نشان می‌دهند که HMGB1 در پاتوژن آسیب حاد کبدی نشأت گرفته از محرك‌های گوناگون، نقش دارد (۹۲،۵۱). در حضور میکروارگانیسم خارجی یا آسیب داخلی، HMGB1 امکان دارد به خارج از سلول به عنوان سیگنال استرس و واسطه التهابی رها شود. پروتئین HMGB1 به عنوان شاخص آسیب به کبد شناخته شده است و سطوح HMGB1 در سرم بیماران با هپاتیت مزمن و سیروز به میزان قابل توجهی بالا است (۹۵،۴۸).

نقش در التهاب

پروتئین HMGB1 توسط سلول‌های ایمنی (مثل ماکروفازها، مونوسیت‌ها و سلول‌های دندریتیک) از طریق مسیر ترشحی ترشح می‌شود. ماکروفازهای فعال شده و مونوسیت‌ها HMGB1 را به عنوان سایتوکاینی که واسطه در التهاب است ترشح می‌کند. بیان بیش از حد HMGB1 منجر به التهاب گسترده مرتبط با بیماری‌های آتروواسکلروز، آرترویت و عفونت است. به تازگی HMGB1 واسطه التهابی مهم در انواع بیماری‌های ایجاد شده توسط پاسخ‌های التهابی ایمنی افزایش یافته غیر عادی شناخته شده است (۹۰،۳۸).

نقش در آپوپتوز

پروتئین HMGB1 نقش مهمی در آپوپتوز، وابسته به نوع سلول دارد. این پروتئین به عنوان مهارکننده مرگ سلول مخمر تحريك شده توسط اعضای خانواده پیش آپوپتوز- Bcl-2 همانند Bak است. مهار Bak توسط HMGB1 در سلول‌های لوکمیای K562/A02 نتیجه‌اش معکوس کردن مقاومت به آدریامایسین (ADM) است و به طور معناداری، رهاسازی Smac/DIABLO تحریک شده توسط آدریامایسین از میتوکندری به سیتوپلاسم را تقویت می‌کند و فعال کردن کاسپاز ۳ را افزایش می‌دهد (۸۴،۱۳).

نقش در متاستاز و رگزایی

اثر HMGB1 توسط تنظیم پایین RAGE با استفاده از مولکول‌های آنتی سنس مهار می‌شود. آنتی‌بادی مورد هدف قرار دهنده HMGB1 رگزایی را تحت شرایط درون تنی و

تحریک شده توسط Hp91، منجر به افزایش ترشح سایتوکاین و کموکاین های پیش التهابی نظری IL-12 می شود. در حقیقت، DC های در معرض قرار گرفته با پپتیدهای مشتق از HMGB1 تکثیر سلول های T اختصاصی آنتی زن در شرایط *in vitro* را تحریک می کند. این ویژگی های Hp91 مربوط به تحریک کنندگی سیستم ایمنی است و چون که پپتیدها آسان تولید می شوند، کاندید مناسبی به عنوان ادجوانات برای توسعه واکسن درنظر گرفته می شوند (۷۱،۶۹). به تازگی، بررسی ها نشان دادند که Hp91 به عنوان *in vivo* ادجوانات پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال را در تقویت می کند. این پپتید دارای زیرواحد سیستئین در آمینواسید موقعیت ۱۶ مطابق با Cys106 در پروتئین HMGB1 است که برای اتصال HMGB1 به TLR4 و نیز القای ترشح TNF توسط ماکروفازها ضروری است (۶۷). Fagone و همکارانش با بررسی اثر HMGB1 بر آنفولانزا در طی DNA واکسیناسیون به این نتیجه رسیدند که HMGB1 ایمنی بر علیه آنفولانزا را افزایش می دهد (۲۱). به علاوه در مطالعه Muthumani و همکاران با ادغام پلاسمید کد کننده Gag و HIV-1 Env با پلاسمید HMGB1 به عنوان ادجوانات DNA در موش BALB/c و اندازه گیری پاسخ های هومورال و سلولی به این نتیجه رسیدند که ادغام این دو به عنوان ادجوانات تحریک کننده سیستم ایمنی به طور مؤثر پاسخ های اینترفرون گاما و نیز پاسخ ایمنی هومورال را در موش افزایش می دهد و محققان نشان دادند که HIV-1 عنوان ادجوانات مؤثر در واکسیناسیون DNA بر علیه HIV-1 می تواند مورد استفاده قرار گیرد (۵۹).

در مطالعه Talebi و همکاران نشان دادند که پپتید تحریک کننده ایمنی مشتق شده از HMGB1 به عنوان ادجوانات اندوزنوس بسیار مؤثرتر از دمین انتهای N پروتئین Gp96 به منظور بهبود واکسن های پروتئینی بود (۸۰).

بحث

پروتئین HMGB1 به طور وسیعی در بافت های پستانداران بیان می شود و در هسته همه مهره داران وجود دارد. قرار گیری هسته ای HMGB1 به خاطر وجود توالی های آمینواسیدهای ویژه در نواحی ۴۳-۲۷ و ۱۷۸-۱۸۴ می باشد (۴۶، ۲۸). در درون هسته، HMGB1 به عنوان تنظیم کننده ژن فعالیت می کند. به عنوان مثال، این پروتئین منجر به اتصال فاکتورهای تنظیمی مانند ریکامبینازهای J(D)V یا گیرنده-

HMGB1 و RAGE را نشان دادند که بسیار وابسته به تنظیم آتوکراین / پاراکراین، حرکت سلولی و تهاجم سلول های سرطانی است (۷۷، ۱۲). مهار ارتباط RAGE-HMGB1، فعال کردن کینازهای p38/p42 و SAP/JNK MAP را مهار می کند. مکانیسم این مولکول ها در ارتباط با تکثیر تومور، تهاجم و بیان متالوپروتئیناز است. مهار DCs توسط HMGB1 در ارتباط با متاستاز غده لنفاوی سرطان کلون انسان مشخص شده است (۶۶).

متاستاز کبد یکی از شرایط اصلی سرطان کلون است که پیش از بیماران دارای سرطان کلون از متاستاز کبد می میرند. پروتئین HMGB1 از تومورهای اولیه سرطان کلون ترشح می شود و غلظت HMGB1 در تومورهای اولیه یافت می شود (۱۱۰). پروتئین HMGB1 نقش ضد آپوپتوز در سرطان توسط افزایش بیان مهار کننده آپوپتوز سلولی ۲ (c-IAP2) ایفا می کند، بدین منظور ژن هدف NF-κB فعال شده و ارتباط با HMGB1 وابسته به فعال کردن سیگنال اتوفازی است که زنده ماندن سلولی را تقویت می کند. سلول های کشته شده سرطانی توسط شیمی درمانی یا رادیوتراپی HMGB1 را به صورت ضربان دار زمانیکه تومور رشد می کند، رها می کند (۷). پروتئین HMGB1 فاکتور پیش بینی کننده برای پاسخ رادیوتراپی در سرطان مثانه است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت با سطوح بالاتری از پروتئین HMGB1 و مقاومت در برابر اشعه در انواعی از رده های سلولی مختلف وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که اتوفازی بیش از ۳ برابر (p < 0.001) بعد از تحریب پروتئین HMGB1، مهار می شود که حاکی از دلالت نقش آن در اتوفازی به عنوان یکی از عوامل سرطان مثانه است (۶۷).

نقش در واکسن

پروتئین HMGB1 از هسته ماکروفازهای فعال شده یا سلول های نکروتیک رها می شود و می تواند به عنوان ادجوانات داخلی از طریق فعال سازی سلول های دندریتیک، ماکروفازها و سلول های T عمل نماید (۱۰۲، ۸۳). اولین ۲۰ آمینواسید دومین B پروتئین HMGB1، پپتید کوچک حفاظت شده ای است که فعالیت سایتوکاین را نشان می دهد. این پپتید کوچک تحت عنوان Hp91 فعال سازی سلول های دندریتیک انسان و موش را تحریک می کند. سلول های دندریتیک

ایمنی سلولی و همورال و پیله آنتیژن را تحت شرایط درون تنی (*in vivo*) تقویت می‌کند. پپتید 91 Hp تولید شده تحت شرایط درون تنی، سایتوکاین‌های تنظیم کننده سیستم ایمنی و فعال سازی سلول‌های T CD8+ اخترасی آنتیژن را تقویت می‌کند (۴۰، ۵۷، ۱۰۸). در ارتباط با نقش پر اهمیت آن بهعنوان ادجوانات، یافته‌های اخیر ما نشان داد که پپتید 91 و طول کامل ژن HMGB1 توانستند بهعنوان ادجوانات مؤثر بهمنظور بهبود کارآیی واکسن‌های درمانی ادجوانات را بهبود کارآیی واکسن‌های درمانی پروتئینی و pDNA در مقابل عفونت ویروس پاپیلومای انسانی به ترتیب عمل کنند. در حقیقت، ایمونیزاسیون همزمان پروتئین 7 HPV16E7 با پپتید 91، ترشح اینترفرون گاما و آنتی‌بادی IgG2a را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داد و درصد موش‌ها را در مقابل چالش تومور TC-1 حفاظت کرد (۴۱).

به هر حال، نقش‌های متضادی در ارتباط با پروتئین HMGB1 مطرح می‌باشد. برای نمونه، پروتئین HMGB1 می‌تواند تکثیر ویروس را در عفونت حاد توسط القای مهارکننده‌های ورود ویروسی کاهش دهد، اما ممکن است باعث تکثیر ویروس در سلول‌های دچار عفونت، از جمله در سلول‌های بیماران آلوده به HIV شود (۲۷). این پروتئین تکثیر HIV در سلول‌های میلیونی را تنظیم می‌کند (۸۹). پروتئین HMGB1 تکثیر ویروسی را توسط اتصال به پروتئین‌های ویروس HCV افزایش می‌دهد اما اثری بر ترجمه این ویروس ندارد. عفونت HCV باعث انتقال پروتئین HMGB1 از هسته به سیتوپلاسم می‌شود، که در آنجا با ژنوم HCV تعامل می‌کند (۴۱، ۱۰۴). در موش‌های ترنس ژن دارای HMGB1، HBV ممکن است دخیل در تکثیر لنفوسيت‌های سایتوکسیک (CTLs)- آغاز کننده آسیب‌های کبدی باشد، در صورتی که در التهاب، HMGB1 می‌تواند از سلول‌های نکروز شده و نوتروفیل واسطه در آسیب کبدی رها شود. این نتایج نشان دادند که درمانی که مهارکننده HMGB1 باشد ممکن است یک استراتژی بالقوه برای مبارزه با HCC-هپاتیت ایجاد کند. با این حال، نقش HMGB1 در ایمنی بر علیه سرطان کبد نیازمند مطالعه‌های بیشتر است (۴۶).

نتیجه‌گیری


پروتئین HMGB1 بهعنوان پروتئین هسته‌ای حفاظت شده دارای نقش‌های مختلفی در زمینه‌های ایمونولوژی، ژنوم، واکسن و بیماری‌زاوی است. بهطور کلی، پروتئین HMGB1 و

های هورمون‌های هسته‌ای می‌شود (۱۸). تحت شرایط فیزیولوژی، HMGB1 در هسته به عنوان چاپرون DNA نقش ترمیم، نوترکیبی، تنظیم رونویسی، تکثیر و پایداری ژنوم فعالیت می‌کند (۳۳، ۴۵، ۶۰). با توجه به تحقیق‌های به عمل آمد، به تازگی گزارش‌هایی حاکی از نقش‌های خارج سلولی HMGB1 منتشر شده است برای مثال، فعالیت HMGB1 به عنوان واسطه در التهاب و دخیل در پاتوزن سپسیس به اثبات رسیده است (۶۱). بعلاوه، HMGB1 الگوی مولکولی وابسته به خطر است و می‌تواند به طور فعالانه به محیط خارج سلولی ترشح شود و به عنوان سایتوکاین، کموکاین و فاکتورهای رشدی در چندین فرایند مانند مهاجرت سلولی، تمایز سلولی، تکثیر سلولی فعالیت کند (۴). در چندین بیماری التهابی مانند سرطان، ترومما، آرتربیت، سپسیس، دیابت و بیماری‌های خود ایمن نقش دارد (۱۵، ۵۶). اگرچه گیرنده اختصاصی برای HMGB1 شناسایی نشده است اما به نظر می‌رسد که عملکرد مؤثر آن در اثر اتصال به گیرنده‌های متنوع مانند TLR2، RAGE یا TLR4 رخ می‌دهد (۹۶، ۱۰۳). بررسی‌ها نشان دادند که تغییرهای سطح HMGB1 در پاسخ به ایمونوتراپی به عنوان مارکر می‌باشد. بیان HMGB1 در نمونه‌های بالینی اولین بار توسط Kuniyasu و همکارانش مطرح شد. بیان بالای HMGB1 در ارتباط با هر نشانه‌ای از سرطان، شامل قابلیت تکثیر نامحدود، توانایی گسترش رگ‌های خونی (آنژیوژن)، فرار از مرگ سلولی HMGB1 برنامه ریزی شده (آپوپتوز) است (۶۴). بیان بالای HMGB1 در انواعی از بدخیمی‌ها نظیر سرطان روده بزرگ، سرطان سینه، سرطان کبد، سرطان لوزالمعده، سرطان پروستات و سرطان دهانه رحم مشاهده شده است (۱۰۰). همچنین، HMGB1 برای توسعه درمان‌های هدفمند نظیر ادجوانات درمانی بهمنظور به تأخیر انداختن رشد تومور مطرح شده است (۱۰۶، ۲۹، ۱۰۹). گزارش شده است که HMGB1 نه تنها القا کننده پاسخ ایمنی ذاتی از طریق اتصال به گیرنده‌های شبه Toll (Toll ۴/۲) و یا گیرنده برای محصول‌های پیشرفته گلیکوزیله شدن (RAGE) است بلکه تعدیل کننده پاسخ ایمنی اکتسابی توسط تحریک تکثیر سلولی و فعال سازی سلول‌های T می‌باشد. این ویژگی نشان می‌دهد که HMGB1 ممکن است به عنوان ادجوانات استفاده شود (۳۲). در یک بررسی، یک پپتید مشتق از دومین B-box HMGB1 به نام Hp91 به عنوان محرك مؤثر و قوی بلوغ DC عمل کرده و توانسته است سایتوکاین‌های القا کننده پاسخ نوع Th1 را تولید کند. در حقیقت Hp91 پاسخ‌های


در مقابل عفونت ویروس پاپیلومای انسانی به ترتیب عمل کنند.

پپتید مشتق از آن (Hp91) به عنوان بیومارکر و ادجوان نقش های به سزایی ایفا کرده اند. با توجه به مطالعه های انجام شده، Hp91 پپتید مشتق شده از پروتئین HMGB1، به عنوان محرك مؤثر و قوی بلوغ DC عمل کرده و توانسته است پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال را تحت شرایط درون تنی تقویت کند. یافته های اخیر ما نیز نشان داد که پپتید و طول کامل زن HMGB1 توانستند به عنوان ادجوان مؤثر به منظور بهبود کارآیی واکسن های درمانی پروتئینی و DNA دی

شکل ها:



شکل ۱: ساختار HMGB1 شامل سه بخش جعبه A، جعبه B و دنباله اسیدی است.



شکل ۲: فعالیتهای بیولوژیکی مختلف HMGB1 در مکانهای سیتوزول، هسته و مایع خارج سلولی

منابع:

1. Agresti A, Lupo R, Bianchi ME, Müller S. HMGB1 interacts differentially with members of the Rel family of transcription factors. *Biochem Biophys Res Commun*, 2003;302(2):421-6.
2. Andersson U, Wang H, Palmblad K, Aveberger AC, Bloom O, Erlandsson-Harris H, Janson A, Kokkola R, Zhang M, Yang H, Tracey KJ. High mobility group 1 protein (HMG-1) stimulates proinflammatory cytokine synthesis in human monocytes. *J Exp Med*, 2000; 192: 565–570.
3. Bala AM. Concerted action of Nrf2-ARE pathway, MRN complex, HMGB1 and inflammatory cytokines - Implication in modification of radiation damage. *Redox Biol* 2014;4: 2832–846.
4. Baldrick P, Richardson D, Elliott G, Wheeler AW. Safety evaluation of monophosphoryl lipid A (MPL): an immunostimulatory adjuvant. *Regul Toxicol Pharmacol*, 2002; 35:398 – 413.
5. Barreiro-Alonso, A., Lamas-Maceiras, M., Rodríguez-Belmonte, E., Vizoso-Vázquez, Á., Quindós, M., Cerdán, M.E. High Mobility Group B Proteins, Their Partners, and Other Redox Sensors in Ovarian and Prostate Cancer. *Oxid Med Cell Longev*, 2016. 2016: 5845061.
6. Benedetti G, Bonaventura P, Lavocat F, Miossec P. IL-17A and TNF- α Increase the Expression of the Antiapoptotic Adhesion Molecule Amigo-2 in Arthritis Synoviocytes *Front. Immunol* 2016; 7: 254.
7. Bi MR, Zhu LY, Yan BZ, Chen LY, Wang FX, Ma YJ, Yang BS. Association of Upregulated HMGB1 and c-IAP2 Proteins With Hepatocellular Carcinoma Development and Progression. *Hepat Mon*, 2014;14(12):e23552.
8. Bolhassani A, Mohit E, Ghasemi N, Salehi M, Taghikhani M, Rafati S. Enhancement of potent immune responses to HPV16 E7 antigen by using different vaccine modalities. *BMC Proceed*, 2011; 5(1):P19.
9. Bolhassani A, Rafati S. Potential immuno-stimulators in vaccine design. *Human Vaccines Immunotherap*, 2013; 9(1): 153–161.
10. Bolhassani A, Zahedifard F, Taslimi Y, Taghikhani M, Nahavandian B, Rafati S. Antibody detection against HPV16 E7 & GP96 fragments as biomarkers in cervical cancer patients. *Indian J Med Res*, 2009; 130: 533-541.
11. Bonaldi T, Talamo F, Scafidi P, Ferrera D, Porto A, Bachi A, Rubartelli A, Agresti A, Bianchi ME. Monocytic cells hyperacetylate chromatin protein HMGB1 to redirect it towards secretion. *EMBO J*, 2003; 22 (20): 5551±5560.
12. Brezniceanu ML, Volp K, Bosser S, Solbach C, Lichter P, Joos S, Zörnig M. HMGB1 inhibits cell death in yeast and mammalian cells and is abundantly expressed in human breast carcinoma. *FASEB J*, 2003; 17: 1295–1297.
13. Chen Q, Bei J, Liu C, Feng Sh, Zhao W, Zhou Z, Yu Z, Du X, Hu H. HMGB1 Induces Secretion of Matrix Vesicles by Macrophages to Enhance Ectopic Mineralization. *PLoS One*, 2016; 11(5): e0156686.
14. Chen XL, Sun L, Guo F, Wang F, Liu S, Liang X, Wang RS, Wang YJ, Sun YX. High-Mobility Group Box-1 Induces Proinflammatory Cytokines Production of Kupffer Cells through TLRs-Dependent Signaling Pathway after Burn Injury. *PLoS ONE*, 2012; 7(11): e50668.
15. Chilton PM, Hadel DM, Thao T. Mitchell TC, Richard P. Darveauc. Adjuvant Activity of Naturally Occurring Monophosphoryl Lipopolysaccharide Preparations from Mucosa-Associated Bacteria. *Infection Immun*, 2013; 81(9): 3317–3325.
16. Czura CJ, Yang H, Tracey KJ. High Mobility Group Box-1 as a Therapeutic Target Downstream of Tumor Necrosis Factor. *J Infec Diseases* 2003; 187(2):S391–6.
17. Dai Y, Wong B, Yen Y, Oettinger MA, Kwon J, Johnson JC. Determinants of HMGB Proteins Required To Promote RAG1/2-Recombination Signal Sequence Complex Assembly and Catalysis during V(D)J Recombination. *Molecular Cellular Biology*, 2005; 25(11):4413–4425.
18. Daniels MJ, Brough D. Unconventional Pathways of Secretion Contribute to Inflammation. *Int J Mol Sci*, 2017;18(1).

19. Elfeky M, Kaede R, Okamatsu-Ogura Y, Kimura K. Adiponectin Inhibits LPS-Induced HMGB1 Release through an AMP Kinase and Heme Oxygenase-1-Dependent Pathway in RAW 264 Macrophage Cells Mediators Inflamm, 2016; 2016: 5701959.
20. Ellerman JE, Brown CK, de Vera M, Zeh HJ, Billiar T, Rubartelli A, Lotze MT. Masquerader: high mobility group box-1 and cancer. Clin Cancer Res, 2007;13:2836–2848.
21. Fagone P, Shedlock DJ, Bao H, Kawalekar OU, Yan J, Gupta D, Morrow MP, Patel A, Kobinger GP, Muthumani K, Weiner DB. Molecular adjuvant HMGB1 enhances anti-influenza immunity during DNA vaccination. Gene Ther, 2011; 18: 1070-1077.
22. Faham A, Bennett D, Altin JS. Liposomal Ag engrafted with peptides of sequence derived from HMGB1 induce potent Ag-specific and anti-tumour immunity. Vaccine, 2009; 27: 5846–5854.
23. Finkel P, Frey B, Mayer F, Bösl K, Werthmüller N, Mackensen A, Gaipl US, Ullrich E. The dual role of NK cells in antitumor reactions triggered by ionizing radiation in combination with hyperthermia. Oncoimmunol, 2016;5(6):e1101206.
24. Fujikane R, Komori K, Sekiguchi M, Hidaka M. Function of high-mobility group A proteins in the DNA damage signaling for the induction of apoptosis. Sci Rep, 2016;6:31714.
25. Garcon N, Chomez P, Van Mechelen M. GlaxoSmithKline Adjuvant Systems in vaccines: concepts, achievements and perspectives. Expert Rev Vaccines, 2007;6(5):723-39.
26. Goodwin GH, Johns EW. Isolation and Characterisation of Two Calf-Thymus Chromatin Non-Histone Proteins with High Contents of Acidic and Basic Amino Acids. FEBS J, 1973; 40(1): 215–219 .
27. Gougeon ML, Melki MT, Saïdi H. HMGB1, an alarmin promoting HIV dissemination and latency in dendritic cells. Cell Death Differ, 2012;19(1):96-106.
28. Grover A, Troutt J, Foster C, Basaraba R, Izzo A. High mobility group box 1 acts as an adjuvant for tuberculosis subunit vaccines. Immunol ,2014;142(1):111-23.
29. Guo ZS, Liu Z, Bartlett DL, Tang D, Lotze MT. Life after death: targeting high mobility group box 1 in emergent cancer therapies. Am J Cancer Res, 2013;3(1):1-20.
30. Han L, Zhang M, Wang M, Jia J, Zhao M, Fan Y. High Mobility Group Box-1 Promotes Inflammation-Induced Lymphangiogenesis via Toll-Like Receptor 4-Dependent Signalling Pathway. PLoS One, 2016; 11(4): e0154187.
31. Han X, Cao Y, Wang K, Zhu G. HMGA1 facilitates tumor progression through regulating Wnt/β-catenin pathway in endometrial cancer. Biomed Pharmacother 2016;82:312-8.
32. Harada S, Matsuura W, Liu K, Nishibori M, Tokuyama S. Possible involvement of the HMGB1/RAGE signaling mechanism in the induction of central post-stroke pain induced by acute global cerebral ischemia. Brain Res, 2016;1646:433-40.
33. Harris HE, Andersson U. The nuclear protein HMGB1 as a proinflammatory mediator. Eur J Immunol, 2004; 34: 1503–1512.
34. He Y , Ding Y , Wang D , Zhang W , Chen W , Liu X , Qin W , Qian X , Chen H , Guo Z. HMGB1 bound to cisplatin-DNA adducts undergoes extensive acetylation and phosphorylation in vivo. Chem Sci ,2015; 6: 2074-2078.
35. Hiraku Y, Guo F, Ma N, Yamada T, Wang S, Kawanishi S, Murata M. Multi-walled carbon nanotube induces nitrative DNA damage in human lung epithelial cells via HMGB1-RAGE interaction and Toll-like receptor 9 activation. Part Fibre Toxicol, 2015; 13: 16.
36. Hosseinzadeh S, Daemi A, Bolhassani A. Heat shock proteins as the efficient vehicle in cancer. J Solid Tumor, 2012; 2(3): 47-55.
37. Hou W, Zhang Q, Yan Z, Chen R, Zeh HJ, Kang R, Lotze MT. Tang D. Strange attractors: DAMPs and autophagy link tumor cell death and immunity Open. Cell Death Dis, 2013; 4: e966.
38. Huber R, Meier B, Otsuka A, Fenini G, Satoh T, Gehrke S, Widmer D, Levesque MP, Mangana J, Kerl K, Gebhardt C, Fujii H, Nakashima C, Nonomura Y, Kabashima K, Dummer R, Contassot E, Frenchb LE. Tumour hypoxia promotes melanoma growth and metastasis via High Mobility Group Box-1 and M2-like macrophages. Sci Rep, 2016; 6: 29914.

39. Ivanov S, Dragoi AM, Wang X, Dallacosta C, Louten J, Musco G, Sitia G, Yap GS, Wan Y, Biron CA, Bianchi ME, Wang H, Chu WM. A novel role for HMGB1 in TLR9-mediated inflammatory responses to CpG-DNA. *Blood*, 2007;110(6):1970-81.
40. Jee SH, Kim K, Lee M. "A high mobility group B-1 box A peptide combined with an artery wall binding peptide targets delivery of nucleic acids to smooth muscle cells." *J Cellular Biochem*, 2009; 107(1):pp. 163–170.
41. Jung JH, Park JH, Jee MH, Keum SJ, Cho MS, Yoon SK, Jang SK. Hepatitis C virus infection is blocked by HMGB1 released from virus-infected cells. *J Virol*, 2011;85(18):9359-68.
42. Karuppagounder V, Giridharan VV, Arumugam S, Sreedhar R, Palaniyandi SS, Krishnamurthy P, Quevedo J, Watanabe K, Konishi T, Thandavarayan RA, Modulation of Macrophage Polarization and HMGB1-TLR2/TLR4 Cascade Plays a Crucial Role for Cardiac Remodeling in Senescence-Accelerated Prone Mice. *PLoS One*, 2016; 11(4): e0152922.
43. Kimura R, Mori N. Abundant expression of HMGB1 in human T-cell lymphotropic virus type I-infected T-cell lines and high plasma levels of HMGB1 in patients with adult T-cell leukemia. *Oncolog Letter*, 2014; 7: 1239-1242.
44. Kim S, Kim SY, Pribis JP, Lotze M, Mollen KP, Shapiro R, Loughran P, Scott MJ, Billiar TR. Signaling of high mobility group box 1 (HMGB1) through toll-like receptor 4 in macrophages requires CD14. *Mol Med*, 2013;19:88-98.
45. Ko YB, Kim BR, Nam SL, Yang JB, Park SY, Rho SB. High-mobility group box 1 (HMGB1) protein regulates tumor-associated cell migration through the interaction with BTB domain. *Cell Signal*, 2014;26(4):777-83.
46. Kuniyasu H, Sasahira T, Bhawal UK, Chihara Y, Kurihara M, Yamamoto K, Kirita T. The roles of HMGB1 related angiogenesis and lymphangiogenesis in oral cancer. *Oncol Rev*, 2011; 5(1): 49–55.
47. Land WG. The Role of Damage-Associated Molecular Patterns (DAMPs) in Human Diseases. *Sultan Qaboos Univ Med J*, 2015; 15(2): e157–e170.
48. Lai B, Kong M, Zheng Q, Zhang X, Liu X, Zu K, Chen Y, Zheng S, Li J, Ren F, Lou J, Liu S, Duan Z. Inhibition of the translocation and extracellular release of high-mobility group box 1 alleviates liver damage in fibrotic mice in response to D-galactosamine/lipopolysaccharide challenge. *Mol Med Rep*, 2016; 13(5): 3835–3841.
49. Lei H, Wen Q1, Li H, Du S, Wu JJ, Chen J, Huang H, Chen D, Li Y, Zhang S, Zhou J, Deng R, Yang Q. Paeonol Inhibits Lipopolysaccharide-Induced HMGB1 Translocation from the Nucleus to the Cytoplasm in RAW264.7 Cells. *Inflammation*, 2016;39(3):1177-87.
50. Liu G, Wang J, Park YJ, Tsuruta Y, Lorne EF, Zhao X, Abraham E. High mobility group protein-1 inhibits phagocytosis of apoptotic neutrophils through binding to phosphatidylserine. *J Immunol*, 2008; 181(6): 4240–4246.
51. Lui G, Wong CK, Margaret Ip, Chu YJ, Irene MH, Catherine S K, Zheng L, Lam SY, Wong KT, Winnie WY, Choi KW, Lee N. HMGB1/RAGE Signaling and Pro-Inflammatory Cytokine Responses in Non-HIV Adults with Active Pulmonary Tuberculosis. *PLoS One*, 2016; 11(7): e0159132.
52. Liu H, Fan X, Huang J, Li N, Peng J, Li S, Wang H. Serum level of HMGB1 in patients with hepatitis B and its clinical significance. *Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi*, 2007;15(11):812-5.
53. Liu J, Zhang BL, Sun CL, Wang J, Li S, Wang JF. High mobility group box1 protein is involved in acute inflammation induced by Clostridium difficile toxin A. *Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai)*, 2016; 48(6):554-62.
54. Lotze MT, Tracey KJ. High-mobility group box 1 protein (HMGB1): nuclear weapon in the immune arsenal. *Nat Rev Immunol*, 2005;5:331–342.
55. Luan G, Gao Q, Zhai F, Chen Y, Li T. Upregulation of HMGB1, toll-like receptor and RAGE in human

56. Meshcheryakova E, Makarov E, Philpott D, Andronova T, Ivanov V, "Evidence for Correlation between the Intensities of Adjuvant Effects and NOD2 Activation by Monomeric, Dimeric and Lipophylic Derivatives of N-Acetylglucosaminyl-N-Acetylmuramyl Pep-tides." *Vaccine*, 2007; 25(23): 4515-4520.
57. Mohan T, Verma P, Nageswara Rao D. Novel adjuvants & delivery vehicles for vaccines development: A road ahead. *Indian J Med Res*, 2013; 138: 779-795.
58. Muller S, Scaffidi P, Degryse B, Bonaldi T, Ronfani L, Agresti A, Beltrame M, Bianchi ME. New EMBO members' review: the double life of HMGB1 chromatin protein: architectural factor and extracellular signal. *Embo J*, 2001;20:4337-4340.
59. Muthumani G1, Laddy DJ, Sundaram SG, Fagone P, Shedlock DJ, Kannan S, Wu L, Chung CW, Lankaraman KM, Burns J, Muthumani K, Weiner DB. Co-immunization with an optimized plasmid-encoded immune stimulatory interleukin, high-mobility group box 1 protein, results in enhanced interferon-gamma secretion by antigen-specific CD8 T cells. *Immunol*, 2009;128(1):e612-20.
60. Nguyen AH, Detty SQ, Agrawal DK. Clinical Implications of High-mobility Group Box-1 (HMGB1) and the Receptor for Advanced Glycation End-products (RAGE) in Cutaneous Malignancy: A Systematic Review. *Anticancer Res*. 2017;37(1):1-7.
61. Nguyen AH, Bhavsar SB, Riley EM, Caponetti GC, Agrawal DK. Association of high mobility group BOX-1 and receptor for advanced glycation endproducts with clinicopathological features of haematological malignancies: a systematic review. *Contemp Oncol (Pozn)*. 2016;20(6):425-429.
62. Ogunniyi AD, Paton JC, Kirby AC, McCullers JA, Cook J, Hyodo M, Hayakawa Y, Karaolis DK. "c-di-GMP is an Effective Immunomodulator and Vaccine Adjuvant against Pneumococcal Infection." *Vaccine*, 2008; 26(36): 4676-4685.
63. O'Hagan DT, Rappuoli R. Novel Approaches to Vaccine Delivery. *Pharmaceut Res*, 2004; 21 (9): 1519-1530.
64. Pang X, Zhang Y, Wei H, Zhang J, Luo Q, Huang C, Zhang S. Expression and Effects of High-Mobility Group Box 1 in Cervical Cancer. *Int J Mol Sci*, 2014; 15, 8699-8712.
65. Passos KJ, Fiorini A, Rosado FR, Freitas DV, Lima Neto QA, Pattaro Junior JR, Gaspar VP, Fernandez MA. Ability of HMGB1 protein to bind to intrinsically bent and non-bent DNA sites in the AMPD2 gene amplicon. *Genet Mol Res*, 2016;15(2).
66. Pilzweger, C., Holdenrieder, S. Circulating HMGB1 and RAGE as Clinical Biomarkers in Malignant and Autoimmune Diseases. *Diagnostics*, 2015; 5(2), 219-253.
67. Rovere-Querini P, Capobianco A, Scaffidi P, Valentini B, Catalanotti F, Giazzon M, Dumitriu IE, Müller S, Iannacone M, Traversari C, Bianchi ME, Manfredi AA. HMGB1 is an endogenous immune adjuvant released by necrotic cells. *EMBO reports*, 2004; 5 (8): 826.
68. Rowell JP, Simpson KL, Stott K, Watson M, Thomas JO. HMGB1-Facilitated p53 DNA Binding Occurs via HMG-Box/p53 Transactivation Domain Interaction, Regulated by the Acidic Tail. *Structure*, 2014; 20: 2014–2024.
69. Saenz R, da Silva Souza C, Huang C-T, Larsson M, Esener S, Messmer D. HMGB1-derived peptide acts as adjuvant inducing immune responses to peptide and protein antigen. *Vaccine*, 2010; 28(47): 7556–7562.
70. Saenz R, Futalan D, Leutenez L, Eekhout F, Fecteau JF, Sundelin S, Sundqvist S, Larsson M, Hayashi T, Minev B, Carson D, Esener S, Messmer B, Messmer D. TLR4-dependent activation of dendritic cells by an HMGB1-derived peptide adjuvant. *J Translat Med*, 2014; 12:211.
71. Saenz R, Messmer B, Futalan D, Tor Y, Larsson M, Daniels G, Esener S, Messmer D. Activity of the HMGB1-Derived Immunostimulatory Peptide Hp91 Resides in the Helical C-terminal Portion and is Enhanced by Dimerization. *Mol Immunol*, 2014; 57(2): 191–199.
72. Segal BH, Wang XY, Dennis CG, Youn R, Repasky EA, Manjili MH, Subjeck JR. Heat shock proteins as vaccine adjuvants in infections and cancer. *Drug Discov Today*, 2006;11(11-12):534-40.
73. Shi Y, Galusha SA, Kenneth L. Rock1 Cutting Edge: Elimination of an Endogenous Adjuvant Reduces the Activation of CD8 T Lymphocytes to Transplanted Cells and in an Autoimmune Diabetes Model. *J Immunol*, 2006;176(7):3905-8.

74. Shi Y, Rock KL. Cell death releases endogenous adjuvants that selectively enhance immune surveillance of particulate antigens. *Eur J Immunol*, 2002;32(1):155-62.
75. Srivastava S, Mansure JJ, Almajed W, Cury F, Ferbeyre G, Popovic M, Seuntjens J, Kassouf W. The Role of HMGB1 in Radioresistance of Bladder Cancer. *Mol Cancer Ther*, 2016;15(3):471-9.
76. Sitia G, Iannacone M, Müller S, Bianchi ME, Guidotti LG. Treatment with HMGB1 inhibitors diminishes CTL-induced liver disease in HBV transgenic mice. *J Leukoc Biol*, 2007;81(1):100-7.
77. Sohun M, Shen H. The implication and potential applications of high-mobility group box 1 protein in breast cancer. *Ann Transl Med*, 2016; 4(11): 217.
78. Sparvero LJ, Asafu-Adjei D, Kang R, Tang D, Amin N, Im J, Rutledge R, Lin B, Amoscato AA, Zeh HJ, Lotze MT. RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts), RAGE ligands, and their role in cancer and inflammation. *J Transl Med*, 2009;7:17.
79. Talebi S, Bolhassani A, Mokhtari Azad T, Arashkia A, Modaresi MH. In vitro expression of HPV16 E7 linked to HMGB1 immunoadjuvant in mammalian cells. *Bratislava Med J*, 2016;117 (10): 609 –13.
80. Talebi S, Bolhassani A, Mokhtari Azad T, Arashkia A, Modaresi MH. Immuno-stimulating peptide derived from HMGB1 is more effective than the N-terminal domain of Gp96 as an endogenous adjuvant for improvement of protein vaccines. *Protein & Peptide Letters*, 2016; In Press
81. Talebi S, Bolhassani A, Sadat SM, Vahabpour R, Agi E, Shahbazi S. Hp91 immunoadjuvant: An HMGB1-derived peptide for development of therapeutic HPV vaccines. *Biomedicine and Pharmacotherapy*, 2016; 85:148-154.
82. Tang D, Kang R, Coyne CB., Zeh HJ, Lotze MT. PAMPs and DAMPs: Signal that Spur Autophagy and Immunity. *Immunol Rev*, 2012; 249(1): 158–175.
83. Tang D, Kang R, Livesey KM, Cheh C, Farka A, Loughran P, Hoppe G, Bianchi ME, Tracey KJ, Zeh HJ, Lotze MT. Endogenous HMGB1 regulates autophagy. *J Cell Biol*, 2010.; 190(5): 881–892.
84. Tang D, Kang R, Zeh HJ, Lotze MT. High-mobility Group Box 1 [HMGB1] and Cancer. *Biochim Biophys Acta*, 2010; 1799(1-2): 131.
85. Tessarollo L, Ovcherenko I, Landsman D, Bustin M. Functional compensation among HMGN variants modulates the DNase I hypersensitive sites at enhancers. *Genome Res*, 2015; 25(9): 1295–1308.
86. Thirugnanam S, Munirathinam G, Veerapathran A, Dakshinamoorthy G, Reddy MV, Ramaswamy K. Cloning and characterization of high mobility group box protein 1 (HMGB1) of *Wuchereria bancrofti* and *Brugia malayi*. *Parasitol Res* , 2012;111(2):619-27.
87. Tian J, Avalos AM, Mao SY, Chen B, Senthil K, Wu H, Parroche P, Drabic S, Golenbock D, Sirois C, Hua J, An LL, Audoly L, La Rosa G, Bierhaus A, Naworth P, Marshak-Rothstein A, Crow, MK, Fitzgerald KA, Latz E, Kiener PA, Coyle AJ. Toll-like receptor 9-dependent activation by DNA-containing immune complexes is mediated by HMGB1 and RAGE. *Nat Immunol*, 2007;8:487–496.
88. Toussi DN, Massari P. Immune Adjuvant Effect of Molecularly-defined Toll-Like Receptor Ligands. *Vaccin*, 2014; 2: 323-353.
89. Trøseid M, Sønnerborg A, Nowak P. High mobility group box protein-1 in HIV-1 infection. *Curr HIV Res*, 2011;9(1):6-10.
90. Tsung A, Sahai R, Tanaka H, Nakao A, Fink MP, Lotze MT, Yang H, Li J, Tracey KJ, Geller DA, Billiar TR. The nuclear factor HMGB1 mediates hepatic injury after murine liver ischemia- reperfusion. *J Exp Med*, 2005;201:1135–1143.
91. Wan W, Cao L, Khanabdali R, Kalionis B, Tai X, Xia S. The Emerging Role of HMGB1 in Neuropathic Pain: A Potential Therapeutic Target for Neuroinflammation. *J Immunol Res*, 2016; 6430423:1-9.
92. Wang B, Yeh CB, Lein MY, Su CM, Yang SF, Liu YF, Tang CH. Effects of HMGB1 Polymorphisms on the Susceptibility and Progression of Hepatocellular Carcinoma. *Int J Med Sci*, 2016;13(4):304-9.
93. Wang J, He GZ, Wang YK, Zhu QK, Chen W, Guo T. TLR4-HMGB1-, MyD88- and TRIF-dependent signaling in mouse intestinal ischemia/reperfusion injury. *World J Gastroenterol* , 2015;21(27):8314-25.

94. Wang K, Huang J, Xie W, Huang L, Zhong C, Chen Z. Beclin1 and HMGB1 ameliorate the α -synuclein-mediated autophagy inhibition in PC12 cells. *Diagn Pathol*, 2016;11:15.
95. Wang X, Xiang L, Li H, Chen P, Feng Y, Zhang J, Yang N, Li F, Wang Y, Zhang Q, Li F, Cao F. The Role of HMGB1 Signaling Pathway in the Development and Progression of Hepatocellular Carcinoma: A Review. *Int J Mol Sci*, 2015;16: 22527-22540.
96. Wang Y, Zhong J, Zhang X, Liu Z, Yang Y, Gong Q, Ren B. The Role of HMGB1 in the Pathogenesis of Type 2 Diabetes. *J Diabetes Res*. 2016;2016:2543268.
97. Wei L, Liu X, Zhang W, Wei Y, Li Y, Zhang Q, Dong R, Kwon JS, Liu Z, Zheng W, Kong B. Overexpression and oncogenic function of HMGA2 in endometrial serous carcinogenesis. *Am J Cancer Res*, 2016;6(2): 249–259.
98. Weir HM, Kraulis PJ, Hill CS, Raine ARC, Laue ED, Thomas JO. "Structure of the HMG box motif in the B-domain of HMG1." *EMBO J*, 1993; 12(4): 1311–1319.
99. Weng H, Deng Y, Xie Y, Liu H, Gong F. Expression and significance of HMGB1, TLR4 and NF- κ B p65 in human epidermal tumors. *BMC Cancer*, 2013; 13:311.
100. Weng H, Liu H, Deng Y, Xie Y, Shen G. Effects of high mobility group protein box 1 and toll like receptor 4 pathway on warts caused by human papillomavirus. *Mol Med Rep*, 2014;10(4):1765-71.
101. Yang D, Oppenheims JJ. Alarms and antimicrobial immunity. *Med Mycol*, 2009; 47 (1): 146 153.
102. Yang H, Lundbaäck P, Ottosson L, Erlandsson-Harris H, Venereau E, Bianchi ME, Al-Abed Y, Andersson U, Tracey KJ, Antoine DJ. "Redox modification of cysteine residues regulates the cytokine activity of high mobility group box-1 (HMGB1)." *Molecular Medicine*, 2012; 18(2): 250–259.
103. Yang R, Tenhunen J, Tonnessen TI. HMGB1 and Histones Play a Significant Role in Inducing Systemic Inflammation and Multiple Organ Dysfunctions in Severe Acute Pancreatitis. *Int J Inflam* 2017; 2017:1817564.
104. Youn, JH, Kwak, MS, Wu J, Kim ES, Ji Y, Min HJ, Yoo JH, Choi JE, Cho HS, Shin JS. Identification of lipopolysaccharide-binding peptide regions within HMGB1 and their effects on subclinical endotoxemia in a mouse model. *Eur J Immunol*, 2011; 41: 2753–2762.
105. Yu R, Yang D, Lei S, Wang X, Meng X, Xue B, Zhu H. HMGB1 Promotes Hepatitis C Virus Replication by Interaction with Stem-Loop 4 in the Viral 5' Untranslated Region. *J Virol*, 2016; 90(5): 2332–2344.
106. Yu Y, Xie M, He YL, Xu WQ, Zhu S, Cao LZ. Role of high mobility group box 1 in adriamycin-induced apoptosis in leukemia K562 cells. *Ai Zheng*, 2008;27(9):929-33.
107. Zabini D, Crnkovic S, Xu H, Tscherner M, Ghannim B, Klepetko W, Olschewski A, Kwapiszewska G, Marsh LM. High-mobility group box-1 induces vascular remodelling processes via c-Jun activation. *J Cell Mol Med*, 2015;19(5):1151-61.
108. Zhang CL, Shu MG, Qi HW, Li LW. "Inhibition of tumor angiogenesis by HMGB1 A box peptide." *Medl Hypothes*, 2008; 70(2): 343–345.
109. Zhang X, Yu J, Li M, Zhu H, Sun X, Kong L. The association of HMGB1 expression with clinicopathological significance and prognosis in Asian patients with colorectal carcinoma: a meta-analysis and literature review. *Onco Targets Ther*. 2016; 9: 4901–4911.
110. Zheng S, Yang J, Tang Y, Yang J, Shao Q, Guo L, Liu Q. Effect of bone marrow mesenchymal stem cells transplantation on the serum and liver HMGB1 expression in rats with acute liver failure. *Int J Clin Exp Pathol*, 2015; 8(12): 15985–15992.