

Introduction of miR-200c as an attenuator of PD-L1 expression in breast cancer cell lines

Sara Hajibabaei¹, Fattah Sotoodehnejadnematalahi¹, Nahid Nafissi², Sirous Zeinali³, Masoumeh Azizi*⁴

1- Department of Biology, School of Basic Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2- Breast Surgery Department, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3- Molecular Medicine Department, Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran

4- Molecular Medicine Department, Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran

۵۹

Abstract

Aim and Background: PD-L1, one of the most important immune-regulating molecules in all cancers including breast cancer, suppresses the immune system against tumor cells. MiRNAs control PD-L1 expression as therapeutic tools and targets. This study investigated the role of miR-200c in reducing PD-L1 expression and breast cancer cell proliferation.

Materials and Methods: In this study, miR-200c targeting the PD-L1 3'UTR was confirmed by bioinformatics and dual-luciferase assay. PD-L1 expression in breast cancer tissues and cell lines was checked compared to normal tissues and cell lines. qRT-PCR was used to measure PD-L1 expression after miR-200c transfection into breast cancer cell line. The MTT test was used to determine the effect of miR-200c introduction on cell proliferation.

Results: The 3'UTR region of the PD-L1 gene was identified as a target for miR-200c using bioinformatics software and a dual luciferase assay. The decrease in miR-200c expression in breast cancer cells is directly related to the increase in PD-L1 expression ($r = -0.68$, P value = 0.0158). Also, increasing the expression of miR-200c in MDA-MB231, BT549, and MCF7 breast cancer cells decreased the expression of PD-L1 by (0.217±2.3, 0.021±2.11, and 0.012±0.146, respectively). The increased expression of miR-200c decreased the proliferation rate in MDA-MB231 by 0.45 ± 0.012, BT549 by 0.256 ± 0.2, and in MCF7 by 0.164 ± 0.02, compared to non-transfected cells. (Mean ± SE)

Conclusion: MiR-200c may be able to prevent breast cancer progression by targeting the PD-1/PD-L1 pathway, reducing PD-L1 expression, and reducing breast cancer cell proliferation.

Keywords: PD-L1 (Program death ligand-1), miR-200c, breast cancer, Iau Science.

Corresponding author:

Molecular Medicine Department, Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran,

Email: mazizi528@gmail.com

معرفی miR-200c به عنوان کاهنده بیان PD-L1 در رده‌های سلولی سرطان پستان

سارا حاجی بابایی^۱، فتاح ستوده‌نژاد نعمت‌الهی^۱، ناهید نفیسی^۲، سیروس زینلی^۳، معصومه عزیزی^{۳}

۱. گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۲. استادیار، جراح متخصص، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

۳. استاد انسیتو پاستور، انسیتو پاستور ایران، بخش پزشکی مولکولی، تهران، ایران

۶۰

چکیده:

سابقه و هدف: گیرنده ۱ پروتئین مرگ برنامه‌ریزی شده سلول (PD-L1)، به عنوان یکی از مهم‌ترین مولکول‌های کنترل کننده سیستم ایمنی در انواع سرطان‌ها (از جمله سرطان‌پستان)، نقش بسزایی در سرکوب سیستم ایمنی علیه سلول‌های توموری ایفا می‌کند. miRNA‌ها، به عنوان ابزارها و اهداف درمانی امیدوارکننده، نقش مهمی در کنترل بیان PD-L1 دارند. در این مطالعه، با توجه به نقش احتمالی سرکوب‌کننده‌گی تومور miR-200c در سرطان‌پستان، مشارکت این miRNA در کاهش بیان PD-L1 و در نهایت کاهش تکثیر سلولی در سلول‌های سرطانی پستان بررسی شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، ابتدا هدف‌گیری miR-200c بر روی 3'UTR PD-L1 با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک و سپس با روش سنجش دوگانه لوسيفراز تایید شد. میزان بیان miR-200c و PD-L1 در رده‌های سرطانی پستان نسبت به رده غیرسرطانی پستان اندازه‌گیری شد. پس از ترانسفکشن miR-200c به درون رده‌های سلولی سرطان‌پستان، جهت بررسی اثر miR-200c بر میزان بیان PD-L1، روش qRT-PCR به صورت کمی مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای بررسی میزان تکثیر سلولی، آزمون MTT انجام گرفت.

یافته‌ها: در مطالعه حاضر، با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک و سنجش لوسيفراز دوگانه، منطقه 3'UTR PD-L1 به عنوان یک هدف برای miR-200c شناسایی و تایید شد. متعاقباً، نتایج ما نشان داد که کاهش بیان miR-200c در سلول‌های رده‌ی سرطان پستان با افزایش بیان PD-L1 ارتباط مستقیم دارد ($P = 0.0158$, $r = -0.68$). همچنین افزایش بیان miR-200c در سلول‌های رده سرطان‌پستان MDA-MB231، BT549 و MCF7، بیان PD-L1 را به میزان (به ترتیب $217 \pm 20/23$)، $111 \pm 11/146$ و $12 \pm 10/146$ کاهش داده است. بیان افزایش یافته miR-200c میزان تکثیر را در MDA-MB231 به میزان $256 \pm 20/164$ و در MCF7 به میزان $45 \pm 10/12$ کاهش داد. (میانگین \pm SE)

نتیجه‌گیری: یافته‌های ما نشان می‌دهد که miR-200c با هدف‌گیری مسیر PD-1/PD-L1 و کاهش میزان بیان PD-L1 و نیز کاهش تکثیر سلول‌های رده سرطانی پستان، ممکن است بتواند به عنوان یک عامل درمانی برای جلوگیری از پیشرفت سرطان پستان باشد.

Iau Science کلیدی: واژگان کلیدی: miR-200c, PD-L1، سرطان‌پستان،

نویسنده مسئول:

انسیتو پاستور ایران، بخش پزشکی مولکولی، تهران، ایران

پست الکترونیکی: mazizi528@gmail.com


تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

مقدمه

کند (۴). مسیر لیگاند مرگ برنامه‌ریزی شده-۱ (PD-L1) گیرنده مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده (PD-1) نقش مهمی در ایمونوتراپی ایفا می کند. PD-L1 با رشد و پیشرفت تومور مرتبط است و در سرطان‌های مختلف مانند ملانوما، سرطان سلول غیرکوچک ریه^۲ (NSCLC)، سرطان سلول‌های کلیوی، سرطان دست و گردن، و سرطان پستان به شدت بیان می شود (۵-۱۰). در حال حاضر مطالعات بسیاری در مورد نقش ذاتی PD-L1 در ترویج تومور و شروع سرطان، متاستاز، توسعه و مقاومت در برابر شیمی درمانی یا رادیوبوتراپی در حال ظهور است (۱۱-۱۳). با این حال، نقش PD-L1 در تنظیم رشد و پیشرفت سرطان پستان و مکانیسم اساسی آن نامشخص است. درمان سرطان فرد محور بر پایه ژنتیک در ۱۰ سال گذشته پیشرفت کرده است (۱۴). بنابراین نیاز فوری به کشف اهداف تشخیصی و درمانی جدید بر پایه مطالعات مولکولی برای بیماران مبتلا به سرطان وجود دارد (۱۵).

سرطان پستان یک نئوپلاسم شایع در سطح جهانی است که امروزه شیوع بالایی در زنان جوان دارد (۱). سرطان پستان سه گانه منفی^۱ TNBC ۲۰ تا ۱۵ درصد از انواع سرطان سینه را شامل می شود و به عنوان چالش برانگیزترین نوع فرعی این بیماری برای درمان است. TNBC‌ها با عدم وجود گیرنده استروژن (ER)، گیرنده پروژسترون (PR) و گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی^۲ (HER2) مشخص می‌شوند. علاوه بر این، مرحله پایانی TNBC اغلب با متابستاز به استخوان، کبد و مغز همراه است. اگرچه جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی ممکن است بقای بیماران TNBC را بهبود بخشد، اما اثربخشی محدودی دارند و نیز میزان مرگ و میر بیماران عودکننده همچنان بالا است. بنابراین، یک استراتژی درمانی جدید برای TNBC‌ها مطلوب است. هدف گیری مولکولی و ایمونوتراپی سرطان نتایج امیدوار کننده ای را در درمان برخی سرطان‌ها از جمله ملانوما و سرطان ریه نشان داده است (۲). مطالعات بیشتر نشان داده اند که سرکوب سیستم ایمنی ناشی از تومور نه تنها مسئول پیشرفت تومور، بلکه در مهار درمان ضد تومور نیز موثر می‌باشد (۳). یکی از عناصر اصلی فرار سیستم ایمنی، لیگاند مرگ برنامه‌ریزی شده ۱ (PD-L1) است که می‌تواند فعل شدن سلول‌های T (CD274)



چکیده گرافیکی. طرحی از نقش مهاری miR-200c به عنوان miRNA سرکوب گر تومور در مهار بیان PD-L1 و در نهایت مهار مسیر PD-1/PD-L1 سیگنالینگ

مقاله پژوهش

۶۲

سرطان پستان ارتباط مستقیم داشته است (۲۲). اعضای خانواده miR-200 می‌توانند با هدف قرار دادن و PD-L1 و ZEB1، سلول‌های CD8+ T را فعال و متاستاز سلول‌های توموری در سرطان ریه را مهار کنند (۲۳). همچنین نشان داده شده است که miR-200c PD-L1 را در کارسینوم کبدی کاهش داده و عملکرد سلول‌های CD8+ T را با واسطه HBV (Hepatitis B Virus) بازیابی کرده است (۲۴). یافته‌های اخیر نشان داده است که بیان بیش از حد پستان منفی دوگانه، که برای تکثیر سلول‌های سرطانی و توسعه تومور با تعديل غلاظت cAMP سلولی حیاتی بوده است، توسط miR-200c کنترل شده است (۲۵). در حالی که امروزه miRNA ها را می‌توان به طور معمول در سطح کل رونوشت مشخص کرد، روش‌شن دهن اهمیت عملکردی miRNA ها در تومورزایی بسیار سودمند می‌باشد. شبکه تحقیقاتی اطلس ژنوم سرطان (TCGA) داده‌های ژنومی جامعی را برای بیش از ۱۱۰۰۰ نمونه تومور که ۳۳ نوع سرطان را نشان می‌دهند، تولید و در دسترس عموم قرار داده است. این منبع شامل داده‌هایی برای نمونه‌های تومور و نمونه‌های طبیعی مجاور آن است و بزرگترین نوع خود در سراسر جهان است (۲۶). استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک به عنوان منابعی برای ذخیره سازی، پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها به شناسایی و اعتبارسنجی بیومارکرهای تشخیصی کمک زیادی کرده است (۲۷). در این مطالعه هدف ما، با توجه به نقش احتمالی سرکوب‌کنندگی تومور miR-200c در سرطان پستان، از طریق تجزیه و تحلیل ارتباط بین بیان miR-200c و PD-L1 در توسعه سرطان پستان، مشارکت miR-200c در مهار پیشرفت این بیماری پیش‌بینی شده است. ابتدا ما هدف‌گیری روی ۳'UTR miR-200c را بر روی PD-L1 با روش لوسيفراز دوگانه تأیید کردیم. در این مطالعه، به منظور تایید تغییرات بیانی CD274 mRNA به دست آمده از Cytoscape، نمودارهای پروفایل بیان آنها را با ابزار تحلیل TCGA UALCAN بررسی کردیم. نتایج ما نشان داد که miR-200c در رده‌های سلولی سرطان پستان در مقایسه با سلول‌های رده نرمال پستان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این، بیان PD-L1، به طور قابل توجهی در رده‌های سلولی سرطان پستان افزایش یافته و پس از افزایش بیان miR-200c در رده‌های سلولی سرطان پستان، کاهش بیان PD-L1 را نشان دادیم. به منظور بررسی

اکثر mRNA های پستانداران را می‌توان توسط RNA های کوچک غیر کننده miRNA ها در سطح پس از رونویسی تنظیم کرد که منجر به خاموش شدن یا تحریب رونویسی می‌شود. miRNA های غیرکننده درون زای ۱۸ تا ۲۲ نوکلئوتیدی هستند که بر فرآیندهای تومورزایی، از جمله تکثیر سلولی، آپوپتوز، تمايز، متاستاز و مقاومت دارویی تأثیر می‌گذارند. RNA های کوچک می‌توانند با اتصال به ناحیه ۳'UTR mRNA miRNA ها می‌توانند به عنوان تنظیم کننده‌های بیان ژن باشند. Biomarker (Biomarker) احتمالی برای سرطان باشند و بر خلاف RNA های دیگر در شرایط درون تنی (۱۶) و برون تنی (۱۷) پایدار می‌باشند. نشان زیستی ها عموماً به یک شاخص قابل سنجش از برخی حالت‌ها و شرایط بیولوژیکی و اطلاعات زیستی اشاره دارند. در حیطه تحقیقات پزشکی، از miRNA ها در زمینه سرطان، جهت تشخیص بر مبنای پروفایل بیانی miRNA و طراحی داروهای هدفمند بر مبنای miRNA استفاده می‌شود. عدم تنظیم miRNAs در ارتباط با انواع سرطان‌ها از جمله سرطان پستان (۱۸) گزارش شده است. علت اختلال در تنظیم miRNA ها در سلول‌های توموری می‌تواند در نتیجه جهش، حذف ژنومی، تغییرات اپی ژنتیکی و یا تغییر در پردازش miRNA ها باشد. بیان نادرست miRNA به صورت اولیه و یا سرکوب یک miRNA می‌تواند به صورت موثر در تومورزایی و یا پیشرفت تومور نقش داشته باشد (۱۹). در خانواده miR-200 پنج عضو وجود دارد که شامل: miR-429، miR-141، miR-200c، miR-200b، ۲۰۰a و miR-200a می‌باشد (۲۰). بر اساس محل قرارگیری هر کدام از miRNA های خانواده ۲۰۰، این microRNA ها به دو گروه تقسیم بندی می‌شوند. miR-200b، miR-200a و miR-429 miR-141 و miR-200c، ۱p36 و ۱p13 قرار گرفته اند. miR-200c به عنوان یک کروموزوم ۱۲p1۳ تومور قادر به تنظیم مهاجرت سلولی، تکثیر، سرکوب کننده تومور، مقاومت دارویی و اختلالات متابولیسم است (۲۱). در مطالعه Antolín و همکارانش که بر روی بیماران مبتلا به سرطان miR-پستان در مقایسه با نمونه نرمال انجام شد، میزان بیان miR-141 و miR-200c miR-200c گردشی در خون با روش Real-time PCR اندازه گیری شد. این گروه نشان دادند که میزان بیان این دو miRNA در بیماران مبتلا به سرطان پستان نقش کنترلی داشته اند و میزان بیان آنها با چگونگی پیشرفت

microRNA ترانسفکت

miRNA Scrambled (به مریخته)، به عنوان کنترل، از Ambion (Life Life, AM17102) خریداری شده است. سلول‌ها یک روز قبل از ترانسفکت کشت داده شدند. طبق پروتکل کیت، در یک میکروتیوب استریل وکتور حاوی ژن (mimic) miRNA-200c (غلهٔ DNA) وکتور حاوی NanoDrop (ThermoScientific, USA) ۲۰۰۰c، محلول Hyperfect Transfection Reagent (Qiagen, Germany) اضافه شد و در یک میکروتیوب دیگر miRNA scrambled Attraccent Transfection Reagent به ۱۰۰nM نهایی (Qiagen, Germany) به صورت جداگانه، اضافه و سپس به سلول‌ها ترانسفکت شدند. پس از شش ساعت، محیط انتقال با یک محیط تازه حاوی ۱۰٪ FBS جایگزین شد. رده‌های microRNA سلولی ترانسفکت شده ۴۸ ساعت پس از انتقال جهت بررسی تاثیر بر میزان بیان PD-L1 برداشت شدند.

آزمون سنجش دوگانه لوسيفراز

از روش سنجش دوگانه لوسيفراز برای تأیید تعامل مستقیم miR-200c و ۳'UTR بین ژن هدف استفاده شد. در انجام آزمایش، برای تکثیر ۳'UTR ژن PD-L1 از پرایمرهای اختصاصی PD-L1 (طبق جدول ۱) استفاده شد. برای این منظور، سلول‌های MCF7، BT549 و MDA-MB231، طور جداگانه با وکتور حاوی ۳'UTR ژن PD-L1 و miR-200c (mimic) یا scrambled بودند، به صورت همزمان ترانسفکت شدند. طبق دستورالعمل کیت لوسيفراز (Promega, USA)، فعالیت لوسيفراز ۴۸ ساعت پس از انتقال، میزان نور منتشره توسط دستگاه POLAR star Omega (BMG LABTECH, Germany) سنجش قرار گرفت.

عملکرد miR-200c، اثر آن بر روی تکثیر سلولی سنجیده شد.

روش بررسی

پیش‌بینی بیوانفورماتیک

ما الگوریتم‌های بیوانفورماتیکی از جمله PicTar, miRanda و TargetScan 4.0 را برای شناسایی ژن‌های بالقوه هدف miR-200c ادغام کردیم. طبق تجزیه و تحلیل پیش‌بینی شده، در ۳'UTR ژن PD-L1 یک محل اتصال احتمالی miR-200c در نظر گرفته شده است. برای تأیید تعامل هدف Renilla luciferase ۳'UTR ژن PD-L1 را در ژن miR-200c psiCHECKTM-2 کلون کردیم. این پلاسمید هم‌زمان با miR-200c یا MDA-MB231، BT549 و MCF7 در سلول‌های (به مریخته) ترانسفکت شد.

کشت سلولی

در این مطالعه آزمایشگاهی، سلول‌های سرطانی پستان رده‌های MCF7، BT549 و MDA-MB231، (به عنوان کنترل) از مرکز ذخایر (Iranian Biological Resources center, IBRC, Tehran, Iran) و رده سلولی غیر سرطانی MCF10a (از بانک سلولی انسنتیوپاستور ایران خریداری و آنها را در محیط کشت Fetal DMEM/F12 (Gibco, USA) غنی شده با ۱۰٪ Bovine Serum (FBS) (Gibco, USA) و ۱٪ سیلین/استرپتومایسین استریل در دمای ۳۷ درجه سلسیوس و هوای مرطوب حاوی ۵٪ CO₂ در فلاسک‌های ۲۵ میلی‌لیتری کشت داده شدند.

سکانس پرایمرها برای Real-time PCR و PCR

۶۴

ژن	سکانس الیگونوکلیوئیدها از ۵' به ۳'
PD-L1	Forward: CCGCTCGAGCAGATAACACATTGGAGGAGA Reverse: ATAAGAATGCCGCCGTGCAGGATTCAAAAGCAT
Gene	Sequence of oligonucleotides from 5' to 3' for real time-PCR analysis
PD-L1	Forward: GTGATCCGCTGCATGATCAG Reverse: GGTAGCCCTCAGCCTGACATG
GAPDH	Forward: CTCTCTGCTCCTCCTGTTCG Reverse: ACGACCAAATCCGTTGACTC
miR-200c-3p	Forward: CACGCCTAACATACTGCCGGGT Reverse: GTATGCAGAGCAGGGTCC
Stem loop miR-200c-3p	CAATTAGACTACACCTGTCCGGTCCCTGCGTCCTGTAGTCTAATTG TCCATC


جدول ۱. توالی پرایمری مورد استفاده در مطالعه

استخراج RNA، سنتز cDNA و Real time qRT- PCR به منظور تغییر بیان ژن PD-L1 توسط ورود miR-200c به سلول‌ها، Total RNA از سلول‌ها استخراج شد (توسط کیت RNA استخراج RNA، Qiagen, Germany). غلظت RNA توسط دستگاه Nano DROP اندازه‌گیری شد و با تعیین نسبت جذب در ۲۶۰ و ۲۸۰A کیفیت RNA مورد ارزیابی RNA قرار گرفت. سنتز cDNA برای miR-200c و U47 (طبق جدول ۱) انجام شد (توسط کیت miR-200c (stem loop (طبق جدول ۱) انجام شد. همچنین بررسی میزان بیان PD-L1 در سلول‌های رده سرطانی و غیر سرطانی پستان نیز از پرایمرهای اختصاصی PD-L1 (طبق جدول ۱) و نیز برای GAPDH (House Keeping Gene) استفاده شد. واکنش‌ها به صورت دوتایی بود و میانگین آنها ارائه شد. در پایان تغییر و میزان بیان ژن‌ها از متد $-\Delta\Delta^{CT}$ Fold change شد و میزان Fold change گزارش گردید.

آزمون MTT

سنجهش تکثیر سلولی با استفاده از 3-(4, 5-dimethylthiazole- 2-yl)-2, 5-biphenyl tetrazolium bromide (MTT) (Sigma, Schnelldorf, Germany) انجام شد. به طور خلاصه 10^4 سلول از سلول‌های MCF7، BT549 و MDA-MB231 در هر چاه یک Jet Biofil, Guangzhou, China) میکروپلیت ۹۶ خانه‌ای (افزوده شدند. پس از آن سلول‌ها با pre-miR-200c یا کنترل منفی طبق پروتکل ذکر شده قبلی ترانسفکت شدند. پس از ۷۲ ساعت، سلول‌ها با MTT (۵۰۰ میکروگرم / میلی لیتر) نامحلول توسط دی متیل سولفوکسید حل شد. چگالی نوری در ۵۴۰ نانومتر (طول موج مرجع: ۶۳۰ نانومتر) و سپس سلول اندازه‌گیری شد. چگالی نوری در ۵۴۰ نانومتر (طول موج مرجع: ۶۳۰ نانومتر) اندازه‌گیری شد و سپس زنده‌مانی سلول نسبت به سلول‌های کنترل درمان نشده تعريف شد. یعنی زنده ماندن برابر $100 \times$ (جذب نمونه تیمار شده)/(جذب کنترل)). تمام آزمایشات سه بار تکرار شد و میانگین نتایج محاسبه شد.

در انتهای ۵' پرایمرهای forward و reverse، توالی محدود به آنزیم‌های محدود کننده Not1/Xho1 قرار داده شدند. پرایمرهای از لحاظ اتصال به نقاط دیگر ژنومیک، در NCBI Blast مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرایمرهای دارای اتصال اختصاصی به توالی مورد نظر هستند. پس از انجام PCR با آنزیم Pfu polymerase (که دارای خاصیت باز آرایی یا اکترونوكلئازی از انتهای ۵'-۳' می‌باشد و قطعه ی تولید شده توسط این آنزیم دارای خطای همانند سازی کمتری می‌باشد و محصول مناسبتری نسبت به آنزیم Taq برای کلون نمودن در وکتور PSICHECK2 تولید می‌کند)، فرآورده بر روی ژل الکتروفوروز ران و تائید شد.



شکل ۱. آشکارسازی فرآورده 3'UTR PCR ژن PD-L1 روی ژل. ردیف ۱: کلونی مثبت حاوی قطعه 3'UTR (1kb) Ladder. ردیف ۲: مربوط به ژن PD-L1 در داخل وکتور psi-check2 که در باکتری Top 10 F' رشد کردند.

اتصال آنها به صورت گرافیک نمایش داده شده است. لازم به ذکر است که این اطلاعات از پایگاه داده Target scan استخراج گردید. همان‌طور که در شکل ۲B نشان داده شده است، miR-200c در مقایسه با الیگونوکلئوتید بهم‌ریخته، فعالیت لوسيفراز را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. انتقال miR-200c به MCF7 و BT549، MDA-MB231 و ۴۴٪/۶۷ ± ۰٪/۲۴ فعالیت لوسيفراز را به ترتیب به میزان ۴۶٪/۶۶ ± ۰٪/۳۱ و ۴۶٪/۵۷٪ کاهش داد.

آنالیز آماری

از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ Inc (Chicago, IL) جهت بررسی آماری داده‌ها استفاده شد. برای تعیین معنی دار بودن میزان بیان ژن‌ها در رده سلول‌های سرطانی و غیر سرطانی پستان از آزمون آماری t استفاده شد. ارتباط بین میزان بیان PD-L1 و miR-200c با روش ANOVA سنجیده شد. برای رسم نمودار از نرم افزار GraphPad prism V.8 استفاده شد.


نتایج

قطعه 3'UTR ژن PD-L1 در وکتور psi-check2 کلون و توالی یابی شد:

پیش‌بینی miR-200c به عنوان miRNA هدف گیرنده‌ی 3'UTR ژن PD-L1 توسط پایگاه‌های داده و ابزارهای بیوانفورماتیک


در این مطالعه با استفاده از پایگاه‌های داده و ابزارهای بیوانفورماتیک پیش‌بینی شده است که احتمالاً ژن PD-L1 miR-200c کنترل شود. در شکل شماره ۲A، نحوه اتصال 3'UTR در ژن PD-L1 و miR-200c همچنین محل

A



۶۶

B




شکل ۲: هدف گیری PD-L1 توسط miR-200c-3p در سلول‌های رده‌ی سرطان پستان.

A دارای نقاط اتصال در 3'UTR PD-L1 انسان است. **B** سنجش دوگانه لوسيفراز انجام در سلول‌های رده‌ی سرطان پستان با miR-200c انجام و کاهش فعالیت نسبی لوسيفراز Renilla مشاهده شد، در حالی که هیچ اثری با mRNA به هم ریخته ریخته تشخیص داده نشد. **p < .01; ns = nonsignificant

Kaplan-Meier در شکل B 3 نمایش داده شده است. بیان OS (Overall Survival) با بقای کلی mRNA PD-L1 در ۱۸۸۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان مرتبط بود (at_۲۲۷۴۵۸) بقای بیماران با بیان بالای PD-L1، در طی یک پروسه ۱۵۰ ماهه، به طور معناداری کوتاه‌تر از بیمارانی با بیان پایین PD-L1 منفی گزارش شده است.

اعتبارسنجی بیان ژن PD-L1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نتیجه UALCAN برای پروفایل بیان ژن PD-L1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان تهاجمی، افزایش بیان این ژن را تایید کرد (شکل ۳A). همچنین منحنی بقا برای بیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس بیان PD-L1 توسط




شکل ۳. نمودارهای جعبه بیان زن و بقای Kaplan-Meier پیماران مبتلا به سرطان پستان با سطوح مختلف بیان.

A PD-L1 جعبه آبی (نوار سمت چپ) نمونه های طبیعی و کادر قرمز (نوار سمت راست) نمونه های تومور اولیه را بیماران مبتلا به سرطان پستان (پایگاه داده اطلس ژنوم انسان TCGA) با استفاده از UALCAN نشان می دهد. **B** منحنی بقای Kaplan- Meier از میان .PD-L1

پستان در مقایسه با رده سلولی غیر سرطانی پستان به صورت معناداری کاهش یافته بود، (شکل 4B). بین کاهش بیان miR-200c و افزایش بیان PD-L1 در سلول‌های سرطان پستان رابطه مستقیم وجود دارد (شکل 4C). پس از آن، سطوح mRNA PD-L1 با روش qRT-PCR اندازه‌گیری شد. بیان افزایش یافته miR-200c سطح mRNA PD-L1 در BT549 MDA-MB231 به میزان $0/217 \pm 2/3$ در به میزان $0/021 \pm 0/11$ و در MCF7 به میزان $0/012 \pm 0/046$ در مقایسه با سلول‌های ترانسفکت نشده کاهش داد (شکل 4D).

معرفی miR-200c به عنوان سرکوبگر بیان انکوژن PD-L1 در سلولهای رده‌ی سرطان پستان

برای تأیید این فرضیه که بیان بیش از حد miR-200c بیان mRNA PD-L1 را در رده‌های سلولی سرطان پستان کاهش می‌دهد، miR-200c یا اولیگونوکلئوتید بهم ریخته به رده‌های سلولی MCF7 و BT549، MDA-MB231 ترانسفکت شد. قبل از ترانسفکت، میزان بیان PD-L1 (شکل 4A) بررسی و نیز جهت تایید طول قطعه تکثیر یافته، محصول نهایی Real-time PCR بر روی ژل آگارز٪۲ آشکار گردید. همچنین میزان بیان miR-200c در سلول‌های رده سرطان




شکل ۴. بیان PD-L1 و miR-200c در سلول‌های رده‌ی سرطان پستان.

سلول‌های رده‌ی سرطان پستان به طور معناداری منجر به کاهش بیان PD-L1 شده است. $p < .001$, $***p < .01$, $*p < .1$, ns نشان دهنده عدم معناداری داده‌ها از نظر آماری است.

miR-200c از تکثیر سلول‌های رده سرطان پستان جلوگیری کرد

تکشیر را در MDA-MB231 به میزان 0.012 ± 0.45 و در BT549 به میزان 0.256 ± 0.02 و در MCF7 به میزان 0.2 ± 0.02 در مقایسه با سلول های ترانسفکت نشده کاهش داد. 0.164 ± 0.01 . در میانگین (SE) سطح سلول T فعال شده، حاوی PD-1 است. هر دو سلول های ایمونولوژیک و سرطانی پروتئین PD-1 را در سطح خود بیان می کنند. با اتصال به L1 از فعال شدن سلول های T حلوگیری می کند (شکل ۵).

بررسی بیان PD-L1 در سلول‌های رده سرطان پستان در مقایسه با سلول رده‌ی غیر سلطانی پستان با استفاده از روش qRT-PCR miR-200c در سلول‌های رده سرطان پستان در مقایسه با سلول رده‌ی غیر سلطانی پستان با استفاده از روش qRT-PCR miR-200c در سلول‌های رده سرطان پستان در مقایسه با سلول رده‌ی غیر سلطانی پستان با استفاده از روش qRT-PCR miR-200c در سلول‌های رده سرطان پستان با کاهش بیان PD-L1 بهمنظور درک نقش عملکردی miR-200c در رده‌های سلولی سرطان پستان، ما تأثیر این miR را بر تکثیر سلولی رده‌های سلولی BT549، MDA-MB231 و MCF7 ارزیابی کردیم. همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است، ۷۲ ساعت پس از انتقال miR-200c به این رده‌های سلولی، تکثیر این سلول‌ها در مقایسه با سلول‌های غیر ترانسفکت شده کاهش یافته است. بیان افزایش یافته miR-200c میزان



شکل ۵. نتایج حاصل از تست MTT سلول های رده سرطانی پستان. پس از ۷۲ ساعت از بیان افزایش یافته miR-200c **p<.01 , ns نشان دهنده عدم معناداری داده ها از نظر آماری است.

L1 در بافت های تومور، به عنوان یک نشانگر، پاسخگویی به درمان های ICB را پیش بینی می کند (۲۸). با این وجود، پاسخگویی به درمان ها برای سرطان پستان و سایر انواع سرطان در مراحل پیشرفته برتری نداشته است (۴). مکانیسم های مقاومت در برابر درمان های ضد PD-1/PD-L1 پیچیده است. مطالعات اخیر نشان داد که فسفوریالاسیون تیروزین و گلیکوزیالاسیون سطحی PD-L1 نقش کلیدی در ارتقای PD-L1/PD-1 می باشد. قابل توجه است که PD-L1 ایفا می کند (۲۹,۳۰). گلیکوزیله نیز می تواند در برابر تشخیص ایمونوہیستوشیمی محفوظ شود و مانع از ارزیابی دقیق وضعیت بیان این زن در سطح پروتئین، در بافت های توموری، می شود (۳۱). همچنین، نشان داده شده است که علاوه بر عملکرد سرکوب کننده سیستم ایمنی PD-L1 در رده های سرطانی سلول های MDA-MB231 و BT549 در مقایسه با رده های سلولی MCF7 و رده سلولی نرمال پستان MCF10a به شدت افزایش می یابد. همچنین با استناد به پایگاه داده ای اطلس ژنوم انسان (TCGA)، سطح بیام PD-L1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان نسبت به نمونه نرمal، به طور میانگین، افزایش یافته و نیز میزان بقا بیماران PD-L1 مثبت نسبت به PD-L1 منفی کاهش یافته است. آنتی بادی های مونوکلولنال که دامین خارج سلولی PD-1 و PD-L1 متصل به غشاء را به عنوان مهارکننده های ایست بیان فرماتیک می توان بینشی را در مورد بررسی شبکه های زن miRNA مربوط به مکانیسم ایست بازرسی ایمنی ارائه

بحث

با معرفی پروتئین مرگ سلولی برنامه ریزی شده ۱ (PD-1) / لیگاند مرگ برنامه ریزی شده ۱ (PD-L1) که مهارکننده های ایست بازرسی ایمنی را هدف قرار می دهد، پس از سال ها تحقیق، پیشرفت قابل توجهی در درمان سرطان پستان حاصل شده است. محور PD-L1/PD-1 که می تواند بین سلول های تومور و سلول های ایمنی عملکردی تشکیل شود، می تواند پاسخ های ایمنی ضد تومور را مهار و فرار سیستم ایمنی را ارتقا دهد. آگاهی از عوامل ایجاد کننده تنظیم بیان PD-L1 علاوه بر اینترفرون ها، به دلیل عملکرد آن در سرکوب سیستم ایمنی بسیار مورد نیاز می باشد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که میزان بیان L1 به عنوان یک انکوژن، در رده های سرطانی سلول های MDA-MB231 و BT549 در مقایسه با رده های سلولی MCF7 و رده سلولی نرمال پستان MCF10a به شدت افزایش می یابد. همچنین با استناد به پایگاه داده ای اطلس ژنوم انسان (TCGA)، سطح بیام PD-L1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان نسبت به نمونه نرمal، به طور میانگین، افزایش یافته و نیز میزان بقا بیماران PD-L1 مثبت نسبت به PD-L1 منفی کاهش یافته است. آنتی بادی های مونوکلولنال که دامین خارج سلولی PD-1 و PD-L1 متصل به غشاء را به عنوان مهارکننده های ایست بیان فرماتیک (ICB) تشخیص می دهند، به طور فزآینده ای برای درمان سرطان به کار گرفته شده اند. بیان PD-1 و PD-L1

همکارانش در سال ۲۰۲۱، اثر ژن‌های هدف miR-200c-3p در سلول‌های SKOV3 ترانسفکت شده با miR-200c مورد ارزیابی قرار دادند. این گروه اعلام داشتند که افزایش بیان miR-200c-3p به طور همزمان با افزایش c-Myc و PD-L1 را کاهش داده و سلول‌های سرطانی تخدمان را حساس کرده. این یافته‌ها بیش جدیدی را در مورد آن که چگونه درمانی معمولی، درمان هدفمند و پرتو درمانی استفاده شود را ارائه می‌دهد و می‌تواند یک استراتژی درمانی جدید برای درمان سرطان تخدمان اپی تلیال باشد. همین طور نشان داده شد که miR-200c به طور مستقیم ناحیه ۳'UTR مربوط به ژن PD-L1 را مورد هدف قرار داده و بیان آن را تنظیم می‌نماید (۴۱). در مطالعه حاضر، با استفاده از تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک، ما منطقه ۳'UTR ژن PD-L1 را به عنوان یک هدف بالقوه برای miR-200c شناسایی کردیم، که نقش احتمالی آن را در فرار سلول‌های توموری از سیستم ایمنی نشان می‌دهد. متعاقباً سنجش لوسيفراز دوگانه تأیید کرد که miR-200c می‌تواند مناطق خاصی از PD-L1 را هدف قرار دهد و بیان آن را به طور قابل توجهی کاهش دهد ($P < 0.01$). همچنین نشان دادیم که تنظیم miR-200c در سلول‌های رده سرطان پستان با نادرست miR-200c ارتباط مستقیم دارد که نشان می‌دهد افزایش بیان PD-L1 ممکن است در تنظیمات پس از رونویسی بیان PD-L1 نقش داشته باشد. در مطالعه حاضر کاهش میزان miR-200c پس از ترانسفکت miR-200c، ناشی از صحیح بودن ترانسفکت و داشتن عملکرد قابل قبول جهت افزایش miR-200c در سلول‌های رده سرطان miR-200c در سلول‌های رده سرطان پستان تاکید کردیم که میتواند تکثیر سلول‌های رده سرطان پستان، نسبت به نمونه‌های ترانسفکت نشده و ترانسفکت شده با miR به هم ریخته، با هدف قرار دادن مستقیم PD-L1، به طور معناداری کاهش دهد. با توجه به نتایج حاصله و محدودیت‌های این مطالعه پیشنهاد می‌شود که بررسی میزان بیان miR-200c در دیگر رده‌های سلولی سرطان پستان، در مدل حیوانی که توالی‌های پیشنهادی و بازدارنده miR-200c به آن تزریق شده است، در نمونه‌های بیماران مبتلا به سرطان پستان، مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین با استفاده از تست‌های مکمل ارتباط بیان miR-200c بازن هادر سطح پروتئومیک

-miRNA کرد (۳۳). پژوهش‌هایی که طی دهه‌ها سال بر روی سرطان انجام شد، منجر به کشف پتانسیل درمانی miRNA گردید که شاهدی بر این مدعاست که miRNA‌ها، به عنوان اهداف فارماکولوژیک، دارای اثراتی افزون بر درمان‌های حال حاضر هستند (۳۴). گزارش شده است که سرکوب کننده تومور p53 می‌تواند بیان PD-L1 را با فعال کردن بیان miR34c و miR-34b، miR-34a و miR-34 مطالعه حاضر که بر روی رده‌های سلولی MDA-MB231 BT549 و MCF7 انجام گرفته است، ابتدا با استفاده از پایگاه‌های داده miRNA و ابزارهای بیوانفورماتیک، ژن PD-L1 به عنوان هدف احتمالی miR-200c در نظر گرفته شد و بیان این miR و ژن هدف (PD-L1) در سه گروه سلول ترانسفکت شده با وکتور پیشساز miR-200c به هم ریخته و سلول‌های ترانسفکت نشده به عنوان کنترل اندازه‌گیری شده است. مطالعات دیگری میزان بیان این miRNA را در رده سلولی MCF7 مقایسه کردیم، اما هدف آنها یا هدف قرار دادن ژن دیگری بوده است (۳۶) و یا مقایسه‌ی پروفایل بیانی miR-200c با سایر miRNA ها (۳۷) و یا مقایسه‌ی آن با رده‌های مقاوم به دارو (۳۸) بوده است. تفاوت این مطالعات با مطالعه حاضر miR-200c انتخاب رده‌های سلولی و نوع ژن هدف گیرنده در ایجاد تومور می‌باشد. خانواده miR-200 نقش مهمی در در پیشرفت تومور، و هم در ساپرس تومور و همچنین در پیشرفت تومور، متاستاز، تهاجم و پاسخ به درمان ایفا می‌کنند. miR-200 به عنوان عضوی از خانواده miR-200 تقسیم بندی می‌شود که نقش مهمی در سرکوب تومور ایفا کرده و کاهش بیان آن در افزایش مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان پستان نقش دارد (۴۰، ۴۱). در مطالعه‌ای که Cailu Song و همکارانش در سال ۲۰۱۵ انجام دادند، نشان داده شد که ترانسفکت سلول‌های رده سرطان پستان توسط miR-200c باعث مهار بیان KRAS شده است.

نتیجه‌گیری

تکثیر و بقای سلول‌های سرطان پستان را در شرایط آزمایشگاهی و درون بدن سرکوب کرد. همچنین با تنظیم منفی KRAS در یک مدل موش زنوگرافت، اثر ضد توموری داشت (۳۶). همچنین Eleni Anastasiadou و

مقاله پژوهش

نیز موردارزیابی قرار گیرد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که miR-200c با هدف‌گیری مسیر PD-1/PD-L1 و کاهش میزان بیان PD-L1 و نیز کاهش تکثیر سلول‌های رده سرطانی پستان، ممکن است بتواند به عنوان یک عامل درمانی برای جلوگیری از پیشرفت سرطان پستان باشد.

منابع

1. He Y, Jiang Z, Chen C, Wang X. Classification of triple-negative breast cancers based on Immunogenomic profiling. *Journal of Experimental & Clinical Cancer Research*. 2018;37(1):1-13.
2. Sharma P. Biology and management of patients with triple-negative breast cancer. *The oncologist*. 2016;21(9):1050-62.
3. Liao Y, Chen L, Feng Y, Shen J, Gao Y, Cote G, et al. Targeting programmed cell death ligand 1 by CRISPR/Cas9 in osteosarcoma cells. *Oncotarget*. 2017;8(18):30276.
4. Chen L, Han X. Anti-PD-1/PD-L1 therapy of human cancer: past, present, and future. *The Journal of clinical investigation*. 2015;125(9):3384-91.
5. Gupta HB, Clark CA, Yuan B, Sareddy G, Pandeswara S, Padron AS, et al. Tumor cell-intrinsic PD-L1 promotes tumor-initiating cell generation and functions in melanoma and ovarian cancer. *Signal transduction and targeted therapy*. 2016;1(1):1-9.
6. Chen L, Xiong Y, Li J, Zheng X, Zhou Q, Turner A, et al. PD-L1 expression promotes epithelial to mesenchymal transition in human esophageal cancer. *Cellular physiology and biochemistry*. 2017;42(6):2267-80.
7. Li Y, Yang X, Wu Y, Zhao K, Ye Z, Zhu J, et al. B7-H3 promotes gastric cancer cell migration and invasion. *Oncotarget*. 2017;8(42):71725.
8. Dai W, Shen G, Qiu J, Zhao X, Gao Q. Aberrant expression of B7-H3 in gastric adenocarcinoma promotes cancer cell metastasis. *Oncology reports*. 2014;32(5):2086-92.
9. Kraft S, Fernandez-Figueras M-T, Richartz NA, Flaherty KT, Hoang MP. PDL1 expression in desmoplastic melanoma is associated with tumor aggressiveness and progression. *Journal of the American Academy of Dermatology*. 2017;77(3):534-42.
10. Lyford-Pike S, Peng S, Young GD, Taube JM, Westra WH, Akpene B, et al. Evidence for a Role of the PD-1: PD-L1 Pathway in Immune Resistance of HPV-Associated Head and Neck Squamous Cell CarcinomaPD-1: PD-L1 Pathway in Head and Neck Cancers. *Cancer research*. 2013;73(6):1733-41.
11. Thompson RH, Gillett MD, Cheville JC, Lohse CM, Dong H, Webster WS, et al. Costimulatory B7-H1 in renal cell carcinoma patients: Indicator of tumor aggressiveness and potential therapeutic target. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2004;101(49):17174-9.
12. Muenst S, Schaefer A, Gao F, Däster S, Trella E, Droeser R, et al. Expression of programmed death ligand 1 (PD-L1) is associated with poor prognosis in human breast cancer. *Breast cancer research and treatment*. 2014;146(1):15-24.
13. Nomi T, Sho M, Akahori T, Hamada K, Kubo A, Kaneko H, et al. Clinical significance and therapeutic potential of the programmed death-1 ligand/programmed death-1 pathway in human pancreatic cancer. *Clinical cancer research*. 2007;13(7):2151-7.
14. Chen G, Noor A, Kronenberger P, Teugels E, Umelo IA, De Greve J. Synergistic effect of afatinib with sunitinib in non-small cell lung cancer cells resistant to gefitinib or erlotinib. *PloS one*. 2013;8(3):e59708.
15. Brothers JF, Hijazi K, Mascaux C, El-Zein RA, Spitz MR, Spira A. Bridging the clinical gaps: genetic, epigenetic and transcriptomic biomarkers for the early detection of lung cancer in the post-National Lung Screening Trial era. *BMC medicine*. 2013;11(1):1-15.
16. Lim LP, Lau NC, Garrett-Engele P, Grimson A, Schelter JM, Castle J, et al. Microarray analysis shows that some microRNAs downregulate large numbers of target mRNAs. *Nature*. 2005;433(7):762-769.
17. Tang F, Hajkova P, Barton SC, Lao K, Surani MA. MicroRNA expression profiling of single whole embryonic stem cells. *Nucleic acids research*. 2006;34(2):e9-e.
18. Hajibabaei S, Sotoodehnejadnematalahi F, Nafisi N, Zeinali S, Azizi M. Inhibitory Effect of miRNA-145 on PD-L1 Expression in Breast Cancer Cell Line. *Iranian Quarterly Journal of Breast Disease*. 2022;14(4):45-61.

19. Calin GA, Croce CM. MicroRNA signatures in human cancers. *Nature reviews cancer*. 2006;6(11):857-66.
20. Huang G-L ,Sun J, Lu Y, Liu Y, Cao H, Zhang H, et al. MiR-200 family and cancer: From a meta-analysis view. *Molecular Aspects of Medicine*. 2019;70:57-71.
21. Mutlu M, Raza U, Saatci Ö, Eyüpoglu E, Yurdusev E, Şahin Ö. miR-200c: a versatile watchdog in cancer progression, EMT, and drug resistance. *Journal of Molecular Medicine*. 2016;94(6):629-44.
22. Antolín S, Calvo L, Blanco-Calvo M, Santiago MP, Lorenzo-Patiño MJ, Haz-Conde M, et al. Circulating miR-200c and miR-141 and outcomes in patients with breast cancer. *BMC cancer*. 2015;15(1):1-15.
23. Chen L, Gibbons DL, Goswami S, Cortez MA, Ahn Y-H, Byers LA, et al. Metastasis is regulated via microRNA-200/ZEB1 axis control of tumour cell PD-L1 expression and intratumoral immunosuppression. *Nature communications*. 2014;5.12-1:(1)
24. Sun C, Lan P, Han Q, Huang M, Zhang Z, Xu G, et al. Oncofetal gene SALL4 reactivation by hepatitis B virus counteracts miR-200c in PD-L1-induced T cell exhaustion. *Nature communications*. 2018;9(1):1-17.
25. Zhang D-D, Li Y, Xu Y, Kim J, Huang S. Phosphodiesterase 7B/microRNA-200c relationship regulates triple-negative breast cancer cell growth. *Oncogene*. 2019;38(7):1106-20.
26. Chu A, Robertson G, Brooks D, Mungall AJ, Birol I, Coope R, et al. Large-scale profiling of microRNAs for the cancer genome atlas. *Nucleic acids research*. 2016;44(1):e3-e.
27. Wang M, Xie T, Fan J. Identification of Hub Genes with Prognostic Values in Lung Cancer by Bioinformatics Analysis. *Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics*. 2019;3(3):131-6.
28. Schmid P, Adams S, Rugo HS, Schneeweiss A, Barrios CH, Iwata H, et al. Atezolizumab and nab-paclitaxel in advanced triple-negative breast cancer. *New England Journal of Medicine*. 2018;379(22):2108-21.
29. Chan L-C, Li C-W, Xia W, Hsu J-M, Lee H-H, Cha J-H, et al. IL-6/JAK1 pathway drives PD-L1 Y112 phosphorylation to promote cancer immune evasion. *The Journal of clinical investigation*. 2019;129(8):3324-38.
30. Hsu J-M, Li C-W, Lai Y-J, Hung M-C. Posttranslational modifications of PD-L1 and their applications in cancer therapy. *Cancer research*. 2018;78(22):6349-53.
31. Li C-W, Lim S-O, Chung EM, Kim Y-S, Park AH, Yao J, et al. Eradication of triple-negative breast cancer cells by targeting glycosylated PD-L1. *Cancer cell*. 2018;33(2):187-201. e10.
32. Tu X, Qin B, Zhang Y, Zhang C, Kahila M, Nowsheen S, et al. PD-L1 (B7-H1) competes with the RNA exosome to regulate the DNA damage response and can be targeted to sensitize to radiation or chemotherapy. *Molecular cell*. 2019;74(6):1215-26. e4.
33. Smolle MA, Calin HN, Pichler M, Calin GA. Noncoding RNA s and immune checkpoints—clinical implications as cancer therapeutics. *The FEBS journal*. 2017;284(13):1952-66.
34. Soriano A, Jubierre L, Almazán-Moga A, Molist C, Roma J, De Toledo JS, et al. microRNAs as pharmacological targets in cancer. *Pharmacological research*. 2013;75:3-14.
35. Cortez MA, Ivan C, Valdecanas D, Wang X, Peltier HJ, Ye Y, et al. PDL1 Regulation by p53 via miR-34. *JNCI: Journal of the National Cancer Institute*. 2016;108.(1)
36. Song C, Liu L-Z, Pei X-Q, Liu X, Yang L, Ye F, et al. miR-200c inhibits breast cancer proliferation by targeting KRAS. *Oncotarget*. 2015;6(33):34968.
37. Zhang G, Zhang W, Li B, Stringer-Reasor E, Chu C, Sun L, et al. MicroRNA-200c and microRNA-141 are regulated by a FOXP3-KAT3B axis and associated with tumor metastasis in breast cancer. *Breast Cancer Research*. 2017;19(1):1-13.

مقاله پژوهش

38. Armada A, Gomes BC, Viveiros M, Rueff J, Rodrigues AS. Regulation of ABCB1 activity by microRNA-200c and microRNA-203a in breast cancer cells: the quest for microRNAs' involvement in cancer drug resistance. *Cancer Drug Resistance*. 2019;2:897-911.
39. Jo H, Shim K, Jeoung D. Potential of the miR-200 Family as a Target for Developing Anti-Cancer Therapeutics. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(11):5881.
40. Kawaguchi T, Yan L, Qi Q, Peng X, Gabriel EM, Young J, et al. Overexpression of suppressive microRNAs, miR-30a and miR-200c are associated with improved survival of breast cancer patients. *Scientific reports*. 2017;7(1):1-12.
41. Anastasiadou E, Messina E, Sanavia T, Mundo L, Farinella F, Lazzi S, et al. Mir-200c-3p contrasts pd-11 induction by combinatorial therapies and slows proliferation of epithelial ovarian cancer through downregulation of β -catenin and c-myc. *Cells*. 2021;10.519:(۳)