



Scan online to view this article

Detection of virulence genes of *intimin*, *hemolysin* and *shigatoxin* in *Escherichia coli* isolated from *Psittacin*

Amir Hossein Ziauddin¹, Majid Gholami-Ahangaran^{2*}, Asiye Ahmadi-Dastgerdi³

1. Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2. Department of Clinical Sciences, Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3. Department of Food Science and Technology, Ardestan Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran.

Abstract

Aim and Background: *Escherichia coli* (*E. coli*) is a common infectious agent between humans and animals that has high virulence genes. One of the virulence genes important in *E. coli* strains is the agent that binds bacteria to mucosal cells. Furthermore, the virulence genes of *hemolysin* and *shigatoxin* can also cause gastrointestinal complications by producing bacterial toxin. Therefore, *E. coli* strains that contain the aforementioned virulence genes can cause disease in humans. Since, pet birds have a very close relationship with their owners; it is possible to transfer this agent from these birds to humans. Identifying the status of different *E. coli* strains isolated from *psittacine* can be effective in controlling the virulence genes.

Material and Methods: For identification of virulence genes in *E. coli* by *psittacine* origin, 100 cloacal soaps were collected from different types of *psittacine* birds from Isfahan & Chahrmahal-va-Bakhtiyari pet shops. After preparation of cultures and purification, the *E. coli* infections were approved by biochemical tests of indol production, Methyl red reduction, Voges-proskawer reaction and citrate reduction. Then, using DNA extraction by boiling method, *hemolysin* (*hly*), *Intimin* (*eae*) and shigatoxin 1 and 2 genes (*stx1* and *stx2*) were detected in *E. coli* strains.

Results: Results showed 18.57, 4.28, 2.85 percent of isolated *E. coli* strains posse *eae*, *stx2* and *hly* genes. Only one strain had *eae*, *hly*, *stx2* (1.42%), simultaneously. No strain has *stx1* gene.

Conclusion: By considering to increasing demand for maintenance of all kinds of parrots as a pet bird for children and adolescents, further care is needed to reduce the risk of zoonosis disease from these birds to human.

Key words: *E. coli*, Intimin, hemolysin, shigatoxin, *Psittacine* birds.

Corresponding author:

Department of Clinical Sciences, Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

Email: mgholami6@gmail.com



برای مشاهده این مقاله به صورت آنلاین اسکن کنید

ردیابی ژن های حدت / اینتیمین، همولیزین و شیگاتوکسین در / شریشیاکلی جدا شده از طوطی سانان

امیرحسین ضیاء الدینی^۱، مجید غلامی آهنگران^{۲*}، آسیه احمدی دستگردی^۳

۱. دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
۲. گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
۳. گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: / شریشیاکلی یک عامل عفونی مشترک بین انسان و حیوانات است که دارای ژن های حدت زیادی است. یکی از ژن های حدت واجد اهمیت اینتیمین است که عامل اتصال باکتری به سلول های مخاطی است. از طرفی ژن های حدت همولیزین و شیگاتوکسین نیز با تولید سم باکتریایی عامل ایجاد عوارض گوارشی هستند. لذا سویه های / شریشیاکلی که واجد ژن های حدت مذکور باشند می توانند در انسان ایجاد بیماری کنند. در این راستا، در مطالعه اخیر به ردیابی ژن های حدت مذکور در سویه های / شریشیاکلی جدا شده از طوطی سانان پرداخته شد.

مواد و روش ها: به منظور شناسایی ژن های حدت در / شریشیاکلی با منشأ طوطی سانان، ۱۰۰ نمونه سوآب از ناحیه کلوک انواع طوطی سانان از کلنی های نگهداری طوطی در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد. پس از کشت و خالص سازی، با تست های بیوشیمیایی به تأیید موارد آلودگی / شریشیاکلی پرداخته شد. سپس با استخراج DNA به روش جوشاندن به ردیابی ژن های همولیزین، اینتیمین و زیررده های ۱ و ۲ شیگاتوکسین (*stx1* و *stx2*) پرداخته شد.

یافته ها: نتایج نشان داد ۱۸/۵۷ درصد از جدایه های / شریشیاکلی جدا شده واجد ژن اینتیمین، ۴/۲۸ درصد واجد ژن *stx2* و ۲/۸۵٪ واجد همولیزین بودند. تنها یک جدایه واجد ژن های اینتیمین و همولیزین و *stx2* به طور همزمان بود (۱/۴۲٪). در هیچ یک از جدایه ها ژن *stx1* ردیابی نشد.

نتیجه گیری: با توجه به افزایش تقاضا برای نگهداری انواع طوطی سانان به عنوان حیوان دست آموز برای کودکان و نوجوانان لازم است مراقبت های بیش تری در جهت کاهش خطر انتقال بیماری های مشترک از این پرندگان به انسان صورت بگیرد.

واژه های کلیدی: شیگاتوکسین، اینتیمین، همولیزین، / شریشیاکلی، طوطی سانان.

مقدمه

/ شریشیاکلی عامل مهم اسهال در کشورهای در حال توسعه است. عامل بیماری به طور گسترده در روده حیوانات وجود

دارد و اکثر عفونت های انسانی در نتیجه مصرف غذای خام یا نیم پز ایجاد می شود. گزارشاتی مبنی بر آلودگی گوشت حیوانات و طیور وجود دارد (۱). به نظر می رسد این باکتری در روده حیوانات به دلیل ساختار گیرنده های گوارشی قادر به بیماری زایی نیست. اما در انسان در صورت وجود ژن عامل اتصال ایجاد بیماری می کند. هم چنین به نظر می رسد که این باکتری با اتصال به سلول های گوارشی و تولید شیگاتوکسین ها می تواند بیماری زایی خود را در انسان ایجاد کند (۲). در خصوص خطر احتمال انتقال عوامل عفونی زئونوز از طوطی سانان اطلاعات کمی وجود دارد. عمده عوارض ناشی از / شریشیاکلی بیماری زای

نویسنده مسئول:

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

پست الکترونیکی: mgholami6@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

پرندگان می‌توانند به‌عنوان مخزن و ناقل *اشریشیاکلی* انتروپاتوژن مطرح باشند (۴). Nielsen و همکاران به بررسی *اشریشیاکلی* تولیدکننده شیگاتوکسین در حیوانات وحشی که در تماس نزدیک با گله‌های خوک و گاو بودند، پرداختند. این بررسی نشان داد موش و پرندگان به‌عنوان ناقل *اشریشیاکلی* تولیدکننده شیگاتوکسین مطرح هستند (۸). در یک بررسی از ۹۷ سویه *اشریشیاکلی* پاتوژن طیور، ۵۲ جدایه از ضایعات سلولیت، سیتی سمی و سندرم تورم سر و ۵ جدایه مدفوعی از ماکیان سالم، واجد توالی ژن شیگاتوکسین بودند. اکثریت این جدایه‌ها واجد ژن *stx1* و فقط ۳ نمونه واجد *stx2* بودند. به نظر می‌رسد طیور به‌ویژه کبوتر در برخی مناطق خاص جغرافیایی به‌عنوان منبع طبیعی *اشریشیاکلی* تولیدکننده شیگاتوکسین عمل می‌کند، به‌طوری‌که کبوترها در کلرادو، ماکیان و کبوتر در هند و ماکیان و کبوتر در فنلاند منبع *اشریشیاکلی* تولیدکننده شیگاتوکسین نبودند (۲). در یک بررسی دیگر Foster و همکاران مدفوع پرندگان وحشی را در جنوب شرق اسکاتلند از لحاظ وجود *اشریشیاکلی* O157H7 مورد بررسی قرار دادند و تنها یک مورد را از لحاظ وجود *اشریشیاکلی* O157H7 مثبت گزارش کردند (۵).

براساس اطلاعات موجود تا به‌حال به‌بررسی خصوصیت‌های انتروتوکسوژنیک *اشریشیاکلی* جدا شده از مدفوع طوطی‌سانان پرداخته نشده است. در همین راستا هدف از مطالعه اخیر شناسایی این باکتری در مدفوع طوطی‌سانان از طریق شناسایی سیتوتوکسین‌های عامل بیماری‌زای روده‌ای (شیگاتوکسین ۱ و ۲) در کنار عامل اتصال باکتری انتروسیت (اینتمین) و شناسایی ژن عامل چسبیدن باکتری به سلول‌های گوارشی و ژن تولیدکننده سیتوتوکسین است.

مواد و روش‌ها

نمونه‌گیری

این مطالعه در بهار ۱۳۹۷ به مدت ۳ ماه انجام شد. ۱۰۰ نمونه سواب از ناحیه کلواک انواع طوطی‌سانان (کاسکو، مرغ عشق، لاوبرد، ماکائو، پاروت، عروس هلندی، کوکاتو و کونور) از کلنی‌های نگهداری طوطی در اصفهان و چهارمحال و بختیاری جمع‌آوری شد و در لوله آزمایش استریل درب‌دار به آزمایشگاه منتقل گردید.

شناسایی *اشریشیاکلی*

در طیور به‌شکل التهاب کیسه هوایی و سیتی سمی است. درباره بیماری‌زایی *اشریشیاکلی* به‌صورت انتزیت در پرندگان اطلاعات زیادی در دست نیست. اما سویه‌های واجد ژن‌های حدت که بتوانند برای دستگاه گوارش بیماری‌زا باشند از نظر بهداشت عمومی در انسان بسیار مهم است (۳). *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین و *اشریشیاکلی* انتروپاتوژن از انواع پاتوتیپ بیماری‌زای گوارشی هستند که می‌تواند منجر به عوارض گوارشی در انسان شود و به‌عنوان پاتوژن زئونوز بررسی می‌شود. *اشریشیاکلی* انتروپاتوژن با چسبیدن و اثرگذاری بر مخاط پوششی روده‌ها منجر به اسهال می‌گردد. این نوع *اشریشیاکلی* واجد ژن اینتمین (*eae*) و پلاسمید EAF هستند. اما *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین علاوه بر این که واجد ژن‌های اتصال و اثرگذاری هستند قادر به تولید شیگاتوکسین هستند که به‌عنوان یک فاکتور حدت بسیار مهم در *اشریشیاکلی* مولد اسهال نقش دارند (۴). ژن شیگاتوکسین واجد دو زیر واحد ۱ و ۲ (*stx1* و *stx2*) است که محصول این زیررده‌های ژنومی قادر به مهار سنتز پروتئین در سلول هستند و در نهایت منجر به مرگ سلول می‌گردد. شیگاتوکسین ۲ بسیار سمی‌تر از شیگاتوکسین ۱ است و اغلب با ایجاد سندرم همولیتیک اورمیک مرتبط است (۴). در بین حیوانات، نشخوارکنندگان به‌عنوان مخزن اصلی *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین هستند، اما سایر حیوانات مانند سگ، گربه و خوک نیز می‌توانند ناقل *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین و *اشریشیاکلی* انتروپاتوژن باشند (۵). علاوه بر آن در برخی مطالعه‌ها سویه‌ای مولد شیگاتوکسین از پرندگان وحشی و حتی طیور اهلی نیز در مناطق مختلف جغرافیایی جدا شده است.

Silva همکاران در سال ۲۰۰۹ به بررسی سویه‌های *اشریشیاکلی* در مدفوع تازه کبوتران پرداختند. نتایج نشان داد ۱۲٪ نمونه‌های دریافتی قادر به تولید شیگاتوکسین بودند (۶). در مطالعه دیگری Schmidt و همکاران واریانت دیگری از شیگاتوکسین ۲ تحت نام *stx2f* را در مدفوع کبوتر شناسایی کردند. شیوع این واریانت در سویه‌های *اشریشیاکلی* مدفوع کبوتر ۱۲/۵٪ گزارش شد (۷). Kobayashi و همکاران در سال ۲۰۰۹ به بررسی خصوصیت‌های سویه‌های واجد ژن‌های اینتمین و شیگاتوکسین در پرنده‌های وحشی ژاپن پرداختند و نشان دادند شیوع سویه‌های واجد ژن اینتمین و شیگاتوکسین به ترتیب ۲۵٪ و ۵٪ است. در این بررسی بیان شده است که

به منظور شناسایی باکتری /شیرشیاکلی، نمونه‌های جمع‌آوری شده، بر روی محیط مک‌کانگی کشت داده شد و برای ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شد. در صورت رویت شدن پرگنه‌های لاکتوز مثبت (صورتی رنگ)، از پرگنه‌های مذکور بر روی محیط EMB به صورت خطی کشت داده شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شد. پرگنه‌های لاکتوز مثبت که بر روی محیط EMB ایجاد جلائی سبز فلزی نمودند به صورت اولیه به عنوان باکتری /شیرشیاکلی شناسایی گردیدند. سپس بر روی این پرگنه‌ها تست‌های افتراقی IMVIC انجام شد. در صورتی که از لحاظ تست‌های بیوشیمیایی تولید ایندول، احیای متیل رد، واکنش Voges-proskauer و احیای سیترات به ترتیب به صورت مثبت، مثبت، منفی، منفی بودند به عنوان /شیرشیاکلی شناسایی شدند.

استخراج DNA

برای استخراج DNA از روش جوشاندن استفاده شد (۹). از کشت ۲۴ ساعته باکتری در محیط BHI به عنوان منبع DNA استفاده شد.

آزمون PCR

برای انجام PCR از دستگاه Master cycler gradient (Eppendorf, Germany) استفاده شد. PCR در حجم ۵۰

میکرولیتر شامل یک، میکرولیتر DNA تخلیص شده (حدود ۵۰ نانو گرم)، ۱۰ میلی‌مول تریس هیدروکلریدریک (اسیدیته ۸/۴)، ۱۰ میلی‌مول کلرید پتاسیم، ۳ میلی‌مول کلرید منیزیم، ۲ میلی‌مول از هر کدام از پرایمرها، ۰/۲ میلی‌مول از هر کدام Taq-polymerase و یک واحد Taq-polymerase و مابقی تا ۵۰ میکرولیتر آب دوبار تقطیر استریل (۳۳/۸ میکرولیتر) انجام شد. مشخصات پرایمرهای مورد استفاده در جدول ۱ آمده است.

برای تعیین فاکتورهای حدت در جدایه‌های /شیرشیاکلی جدا شده از زوج پرایمرهای معرفی شده توسط Fagan و همکاران (۱۹۹۹) استفاده شد (۱۱،۱۰). برنامه حرارتی برای انجام PCR شامل یک سیکل ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳ دقیقه و ۳۵ سیکل تکراری شامل واسرشت‌سازی در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد در ۲۰ ثانیه، همسرشت‌سازی در دمای ۵۸ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۰ ثانیه، گسترش در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد برای ۹۰ ثانیه و گسترش نهایی در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه بود. در پایان محصول PCR بر روی ژل آگارز ۲ درصد به مدت ۴۰ دقیقه با ولتاژ ۱۰۰ ولت و ۴۰۰ میلی‌آمپر الکتروفورز گردید.

جدول ۱- اختصاصات پرایمرهای مورد استفاده

اندازه قطعه (جفت بازی)	توالی پرایمر	نام پرایمر
۱۶۵	F:ACGATGTGGTTTATTCTGGA R:CTTCACGTGACCATACATAT	EHCC <i>hly</i>
۶۱۴	F: ACGTGGATGATCTCAGTGG R: CTGAATCCCCCTCCATTATG	<i>stx1</i>
۷۷۹	F: CCATGACAACGGACAGCAGTT R: CCTGTCAACTGAGCAGCACTTTG	<i>stx2</i>
۸۹۰	F: GTGGCGAATACTGGCGAGACT R: CCCATTCTTTTTCACCGTGC	<i>eaeA</i>


بود. از هشت نمونه /شیرشیاکلی جدا شده از ۱۴ عروس هلندی یک مورد از لحاظ ژن اینتیمین مثبت شد (۱۲/۵ درصد) و از ۱۳ سویه /شیرشیاکلی جدا شده از ۱۹ طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو) دو مورد واجد ژن اینتیمین و یک مورد واجد *stx2* بود. در طوطی برزیلی فقط در دو سویه از ۹ جدایه /شیرشیاکلی جدا شده ژن اینتیمین ردیابی شد. در طوطی‌های سبز از ۱۴ جدایه /شیرشیاکلی جدا شده سه مورد دارای ژن اینتیمین و یک مورد واجد هر دو ژن *stx2* و همولیزین بود. در سه جدایه /شیرشیاکلی جدا شده از کونور و کوکاتو هیچ‌کدام از

یافته‌ها


از صد نمونه سواب کلواک کشت داده شده بر روی محیط مک‌کانگی ۷۰ نمونه از لحاظ کشت اختصاصی و تست‌های بیوشیمیایی به عنوان /شیرشیاکلی شناسایی شدند. میزان آلودگی در هر یک از پرندگان به تفکیک در جدول ۱ آمده است. در خانواده طوطی‌سانان از ۲۲ نمونه /شیرشیاکلی جدا شده از مرغ عشق سه مورد از لحاظ ژن *eae* و یک نمونه از لحاظ هر سه ژن اینتیمین، همولیزین و شیگاتوکسین ۲ مثبت

جدول ۲- وضعیت جدایه‌های مختلف اشریشیاکلی از لحاظ ژن‌های حدت مورد بررسی

گونه طوطی	تعداد قفس پرنده	تعداد جدایه اشریشیاکلی	اينتيمين	هموليزين	شیکاتوکسین ۱	شیکاتوکسین ۲
مرغ عشق	۳۰	۲۲	۴	۱	۰	۱
ماکائو	۱	۱	۱	۰	۰	۰
عروس هلندی	۱۴	۸	۱	۰	۰	۰
کاسکو	۱۹	۱۳	۲	۰	۰	۱
طوطی کوتوله برزیلی	۱۳	۹	۲	۰	۰	۰
کوکاتو	۲	۱	۰	۰	۰	۰
کونور	۳	۲	۰	۰	۰	۰
طوطی سبز	۱۸	۱۴	۴	۱	۰	۱
کل	۱۰۰	۷۰	۱۳	۲	۰	۳
درصد	۱۰۰	۷۰	۱۸/۵۷	۲/۸۵	۰	۴/۲۸




شکل ۲- الکتروفورز مربوط به نمونه‌های مثبت ژن *hly* و *eae* اشریشیاکلی
 ستون یک: مارکر، ستون ۲: نمونه مثبت از نظر ژن *eae* با طول باند ۸۹۰ جفت بازی و *hly* با طول باند ۱۶۵ جفت بازی، نمونه‌های ۳ تا ۵: نمونه‌های مثبت از نظر ژن *eae* با طول باند ۸۹۰ جفت بازی و ستون ۶: کنترل منفی



شکل ۱- الکتروفورز مربوط به نمونه‌های مثبت ژن *hly* و *stx2*، *eae* اشریشیاکلی

ستون یک: مارکر، ستون ۲: نمونه مثبت از نظر ژن *eae* با طول باند ۸۹۰ جفت بازی، *stx2* با طول باند ۷۶۹ جفت بازی و *hly* با طول باند ۱۶۵ جفت بازی مربوط به طوطی سبز، ستون ۳ و ۵: نمونه مثبت از نظر ژن *eae* با طول باند ۸۹۰ جفت بازی، ستون ۴: نمونه مثبت از نظر ژن *eae* با طول باند ۸۹۰ جفت بازی و *hly* با طول باند ۱۶۵ جفت بازی از مرغ عشق، ستون ۶: کنترل منفی)



شکل ۳- الکتروفورز مربوط به نمونه‌های مثبت ژن *eae* اشریشیاکلی
 ستون اول مارکر ۱۰۰ جفت بازی، ستون ۲ و ۳ نمونه مثبت از نظر ژن *eae* با طول باند ۸۹۰ جفت بازی

بحث

اولین بار بررسی آلودگی پرندگان با *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین در سال ۱۹۹۷ مطرح شد که فراوانی *اشریشیاکلی* شیگاتوکسوژنیک در ۱/۶٪ پرندگان وحشی ذکر شد. این پرندگان در تماس نزدیک با فارم‌های پرورشی طیور اهلی بودند که می‌توانستند با مهاجرت، امکان انتقال این جدایه را بین فارم‌ها فراهم کنند (۷). در مطالعه اخیر امکان شناسایی منبع عفونت وجود ندارد. اما می‌توان حدس زد که نگهداری پرندگان زینتی در فروشگاه‌های عرضه‌کننده پرندگان زینتی در مجاورت کبوتران اهلی و وحشی و گزارش‌های مکرر از آلودگی کبوترها با *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین (۱۴) می‌تواند منشاء عفونت باشد. در این مطالعه با توجه به عدم ردیابی ژن همولیزین در دو سویه از جدایه‌های *اشریشیاکلی* واجد ژن شیگاتوکسین، به نظر می‌رسد این دو جدایه واجد ژن شیگاتوکسین از نوع غیر O157H7 باشند. پیش‌تر نیز گزارش‌های زیادی منتشر شده که نشان می‌دهد اگرچه از گونه‌های مختلف پرندگان *اشریشیاکلی* شیگاتوکسین‌زا جدا شده است، اما در اکثر موارد سروتیپ O157H7 جدا نشده است. لذا طبق نتایج به‌دست آمده از مطالعه اخیر و سایر مطالعه‌ها به نظر می‌رسد فراوانی جدایه‌های *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین non-O157 در مدفوع پرندگان از موارد O157H7 پیش‌تر باشد. این یافته اهمیت موضوع انتقال *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین از طریق تماس با پرندگان را دوچندان می‌کند. چرا که ممکن است پرندگان در حالی که هیچ‌گونه علائم بالینی نداشته باشند منبع *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین از نوع غیر O157H7 باشند (۲). به‌رحال تصور اکثریت بر این است که *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین قادر به ایجاد عوارض و مشکلاتی در انسان است که عوامل حدت اینتیمین، همولیزین و شیگاتوکسین را داشته باشد که اگر چنین باشد فقط یک جدایه از جدایه‌های جدا شده در مطالعه اخیر واجد هر سه ژن بوده است و سایر جدایه‌ها ممکن است برای انسان بیماری‌زایی نداشته باشند.

نتیجه‌گیری

از آنجایی که پرندگان زینتی به‌عنوان حیوان دست‌آموز در تماس مستقیم با صاحبان خود هستند ممکن است این پرندگان منبع *اشریشیاکلی* پاتوژن باشند و بتوانند باعث مشکلاتی برای صاحبان خود گردند. با توجه به شناسایی فاکتورهای حدت *اشریشیاکلی*، همولیزین و زیر واحدهای شیگاتوکسین در نمونه‌های جمع‌آوری شده از انواع مختلف

اشریشیاکلی مولد شیگاتوکسین و *اشریشیاکلی* انتروپاتوژن از انواع پاتوتیپ بیماری‌زا هستند که می‌تواند منجر به عوارض گوارشی در انسان شود و به‌عنوان عامل بیماری‌زای مشترک بین انسان و دام مطرح هستند. *اشریشیاکلی* انتروپاتوژن با چسبیدن و اثرگذاری بر مخاط پوششی روده‌ها منجر به اسهال می‌گردد. این نوع *اشریشیاکلی* واجد ژن *اينتيمين* (*eae*) است. اما *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین علاوه بر این که واجد ژن‌های اتصال و اثرگذاری هستند قادر به تولید شیگاتوکسین هستند که به عنوان یک فاکتور حدت بسیار مهم در *اشریشیاکلی* مولد اسهال نقش دارند (۴). از آنجایی که پرندگان زینتی رابطه بسیار نزدیک با صاحبان خود دارند امکان انتقال این عامل از پرندگان زینتی به انسان وجود دارد. شناسایی وضعیت سویه‌های مختلف *اشریشیاکلی* جدا شده از طوطی-سانان از نظر وجود ژن‌های حدت در مراقبت‌های ویژه جهت کنترل این آلودگی می‌تواند مؤثر واقع شود. در این راستا به ردیابی ژن‌های حدت اتصال، اثرگذاری و تولید سیتوتوکسین در این پرندگان پرداخته شد.

نتایج نشان داد ۱۸/۵۷ درصد از جدایه‌های *اشریشیاکلی* واجد ژن *اينتيمين* و ۴/۲۸ درصد واجد ژن *stx2* بودند. ۲/۸۵٪ واجد همولیزین و تنها یک جدایه واجد ژن‌های اینتیمین و همولیزین و *stx2* به‌طور هم‌زمان بود و در هیچ‌یک از جدایه‌ها ژن *stx1* شناسایی نشد. اگرچه در مطالعه‌های قبلی نیز ژن *اينتيمين* و شیگاتوکسین در جدایه‌های مختلف *اشریشیاکلی* ردیابی شده است اما فراوانی *اشریشیاکلی* جدا شده از طوطی‌سانان حدود ۱۷/۱۱٪ گزارش شده است و فراوانی *اشریشیاکلی* شیگاتوکسوژنیک را در پرندگان سالم ۴/۶٪ بیان کرده‌اند. در آن مطالعه، ۸/۴۷ درصد مرغ‌های عشق و ۴/۴۷ درصد پاراکیت‌ها آلودگی *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین را نشان دادند (۱۲).

در مطالعه اخیر تاریخچه دقیقی از علائم گوارشی پرندهایی که در آنها *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین ردیابی شده است وجود ندارد و به ظاهر سالم بوده است. پیش‌تر Croxen و همکاران در سال ۲۰۱۳ عدم وجود گیرنده‌های Globotriaosylceramid را روی سلول‌های paneth در مخاط روده، دلیل عدم حساسیت و عدم بروز علائم کلینیکی در پرندگان آلوده به *اشریشیاکلی* مولد شیگاتوکسین بیان نمودند (۱۳).

طوطی‌سانان در این مطالعه، لازم است به‌طور ویژه برای کودکان و نوجوانان مراقبت‌های بیشتری در جهت کاهش خطر انتقال بیماری‌های مشترک از این پرندگان صورت بگیرد.

1. Wray C, Davies RH, Corkisch JD. Enterobacteriaceae. In: Jordan FTW, Pattison M (Eds). Poultry Diseases. Cambridge: WB Saunders; 1996. p. 9-43.
2. Nolan LK, Barnes HJ, Vaillancourt JP, Abdul-Aziz T, Logue CM. Colibacillosis. In: Swayne DE, Boulianne M, Logue CM, McDougald LR, Nair V, Suarez DL (Eds). Disease of Poultry. 14th ed. Massachusetts: Wiley-Blackwell; 2020. p. 770-790.
3. Lutful Kabir SM. Avian Colibacillosis and Salmonellosis: A Closer Look at Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, Control and Public Health Concerns. Int. J. Environ. Res. Pub Health 2010; 7(1): 89-114;
4. Kobayashi H, Kanazaki M, Hata, E, Kub M. Prevalence and Characteristics of eae- and stx-Positive Strains of Escherichia coli from Wild Birds in the Immediate Environment of Tokyo Bay. J Am Soc Microbiol. 2009; 75 (1): 292-295.
5. Foster G, Evans J, Knight HI, Smith AW, Gunn GJ, Allison Lesley J. Analysis of feces samples collected from wild-bird garden feeding station in Scotland for the presence of verotoxin producing *E. Coli* O157H7. J Am Soc Microbiol. 2006; 72 (3): 2265-2267.
6. Silva VL, Nicoli JR, Nascimento TC, Diniz CG. Diarrheagenic Escherichia coli Strains Recovered from Urban Pigeons (*Columba livia*) in Brazil and Their Antimicrobial Susceptibility Patterns. J Current Microbiol. 2009; 59: 302-308.
7. Schimdt H, Scheef J, Morabito S, Carpioli A, Wieler LH, Karch HA. New Shiga Toxin 2 Variant (Stx2f) from Escherichia coli Isolated from Pigeons. J Am Soc Microbiol. 2000; 66 (3): 1205-1208.
8. Nielsen EM, Skov MN, Madsen JJ, Lodal J, Jespersen JB, Baggesen DL. Verocytotoxin-Producing Escherichia coli in Wild Birds and Rodents in Close Proximity to Farms. J Am Soc Microbiol. 2004; 70 (11): 6944-6947.
9. Oliveira CF, Paim TG, Reiter KC, Rieger A, D'Azevedo PA. Evaluation of four different DNA extraction methods in coagulase-negative staphylococci clinical isolates. Rev Inst Med Trop SP. 2014; 56(1): 29-33.
10. Fagan PK, Hornitzky MA, Bettelheim KA, Djordjevic SP. Detection of shiga-like toxin (stx1 and stx2), intimin (eaeA), and enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) hemolysin (EHEC hlyA) genes in animal feces by multiplex PCR. Appl environ microbiol. 1999; 65(2): 868-72.
11. Gholami-Ahangaran, Zia-Jahromi N. Identification of shiga toxin and intimin genes in *Escherichia coli* detected from canary (*Serinus canaria domestica*). Toxicol Indust Health 2014; 30(8): 724- 727.
12. Gioia-Di Chiacchio RM, Cunha MPVR, Sturn M, Moreno LZ, Moreno AM, Pereira CBP, Martins FH, Franzolin MR, Piazza RMF, Knöbl T. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC): Zoonotic risks associated with psittacine pet birds in home environments. Vet Microbiol. 29; 184: 27–30. doi: 10.1016/j.vetmic. 2016.01.004.
13. Croxen MA, Law RJ, Scholz R, Keeney KM, Wlodarska M, Finlay BB. Recent advances in understanding enteric pathogenic Escherichia coli. Clin Microbiol Rev. 2013; 26(4): 822-80.
14. Morabito S, Dell'Omo G, Agrimi U, Schmidt H, Karch H, Cheasty T, Caprioli A. Detection and characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli in feral pigeons. Vet Microbiol. 2001; 82(3): 275–283.